

de Paris. Il est notoire, au Canada, qu'on empêche toute mère, atteinte d'une pyrexie quelconque, de nourrir son enfant. Or, l'étude des faits qui vont suivre prouvera, qu'en cela, nous exagérons le danger que l'enfant peut courir.

Le docteur Perret raconte qu'il fut appelé le 5 avril auprès d'une femme accouchée depuis le 20 mars et qui présentait des signes évidents d'infection depuis le 1 avril. La température était à 40.5 et même 41° C. On fit un curage digital qui ramena des débris exhalant une odeur infecte. Bref on fit les pansements d'usage dans ces cas. Et l'enfant, qu'en fit-on? On le remit au sein, car on avait supprimé l'allaitement naturel au début de ces accidents infectieux, non sans difficultés de la part de l'entourage. Le premier jour, cet enfant pesait, 3,460 grammes. Le lendemain, il pesait 3,350. Le 7, même poids. A partir de cette date il augmenta régulièrement de poids, malgré une élévation de température assez marquée du côté de la mère qui fit une pneumonie, et le 30 avril il pesait 4,280 gr. Il avait augmenté de 820 grammes en 25 jours, soit 32 grammes par jour.

Le docteur Perret n'a pas voulu, ici, faire un essai, mais il a continué la pratique suivie dans le service du docteur Budin à la clinique Tarnier, alors qu'il en avait la direction.

"Vous comprendrez, dit-il, combien cette question est grosse d'intérêt et quelle importance d'ordre social elle peut acquérir. Il n'y a pas longtemps, lorsqu'une nourrice avait la fièvre, immédiatement on la séparait de son nourrisson, redoutant pour lui l'absorption du mauvais lait. Dans les classes aisées les choses pouvaient s'arranger facilement, on prenait une autre nourrice et tout était dit; mais chez la femme du peuple, il ne saurait en être de même, et là, si la mère ne donne plus le sein à son enfant, c'est pour celui-ci l'allaitement au biberon, le sevrage précoce avec toutes les conséquences que vous connaissez."

Et l'auteur donne le détail d'un grand nombre d'observations que nous résumons succinctement.

1° *Lymphangite*: Mère, accouchée normalement le 25 août. Le 30 signes de lymphangite du sein gauche avec galactophorie à droite. L'enfant pèse 2950 grammes. On fait l'expression du sein droit avec pansement approprié: on fait des pulvé-