

de glaise délayée avec sa salive visqueuse. Elle pond 5 œufs blancs, lavés de roussâtre. Elle fait d'ordinaire 2 couvées par saison, la 1ère vers la fin de Juin et la 2e vers la mi-Août. Elle revient souvent faire sa ponte chaque année dans le même nid.

**2 L'Hirondelle à front blanc.** *Hirundo lunifrons*, Say. *H. opifex*, Dewitt. *Petrochelidon melanogastra*, Cabanis.—Vulg. *L'Hirondelle des cochers*; Angl. *Cliff Swallow*. Longueur 5 pouces; ailes 4.40; queue 2.20 pouces. Couronne et dessus du dos d'un bleu d'acier, séparés par un collier grisâtre. Front d'un blanc sale. Menton, gorge et côtés de la tête d'un marron foncé; ventre blanc. Une tache d'un bleu d'acier sur la gorge. Queue légèrement fourchue.

P. E. & C.—Cette Hirondelle place souvent son nid dans les fissures des rochers ou dans les arbres creux. Elle est très abondante en certains endroits et assez rare en plusieurs autres.

**3. L'Hirondelle bicolore.** *Hirundo bicolor*, Vieill. *H. viridis*, Wils, *H. Cucogaster*, Stiph.—Vulg. *L'H. à ventre blanc*; Angl. *White-bellied Swallow*.—Longueur 6.25 pouces; ailes 5; queue 2.65 pouces. D'un noir lustré métallique à reflets verdâtres en dessus; entièrement blanche en dessous.

P. E. & CC. De mêmes habitudes à peu près que la précédente. On voit souvent en Septembre et Octobre l'Hirondelle à ventre blanc garnir les fils des télégraphes presque sans interruption pendant plusieurs milles de suite. Elle pond 5 œufs blancs.

## 2. Gen. *Cotyle*. Boie.

Bec aplati, très large à la base; narines rondes, proéminentes. Queue moyenne, presque carrée. Tarses grêles, scutellés. Doigts très grêles.

Une seule espèce dans notre faune.

**L'Hirondelle des rivages.** *Cotyle riparia*, Boie. *Hirundo riparia*, Lin.—Angl. *Bank Swallow*.—Longueur 4 $\frac{3}{4}$  pouces; ailes 4; queue 2 pouces. La plus petite de nos Hirondelles. Dessus d'un brun grisâtre quelque peu fuligineux. Dessous d'un blanc pur avec une bande à travers la poitrine et les côtés du corps de même couleur que le dos.