

Bonap.—Vulg., *Petit Butor* ; Angl., *Least Bittern*—Longueur 13 p s. ; ailes 4.75 ; tarses 1.60 ; bec 1.75 pouces. Tête et dessus du corps d'un brun foncé à reflets verdâtres ; partie supérieure du cou, épaules, grandes couvertures et marges extérieures de quelques plumes des tertiaires, d'un roussâtre canelle. Une strie sur l'épaule d'un brun jaunâtre.

Dans la femelle, le verdâtre de la tête et du dos est remplacé par un brun roussâtre.

E.R.R.—Le plus petit de tous nos Hérons. Cette espèce qui est à proprement parler un oiseau du Sud ne se rencontre que très rarement en Canada.

#### 4. Gen. Butor. *Botaurus*, Stephens.

Bec moyen, à peine plus long que la tête, légèrement courbé. Tarses très courts, plus courts que le doigt médian ; largement scutellés. Doigt latéral intérieur le plus long. Ongles très longs, aigus et presque droits. 10 plumes caudales. Plumage lâche, foncé et strié.

Espèce unique.

**Le Butor tacheté.** *Botaurus lentiginosus*, Steph. *Ardea stellaris*, Fost, *Quac*, en certains endroits ; Angl. *Bittern* ; *Stake-driver*.—Longueur 26.50 pouces ; ailes 10 ; tarses 3.60 ; bec 2.75 pouces. D'un jaunâtre brun finement tacheté de brun foncé ou de rougeâtre. Une large bande noire partant de l'oreille et s'étendant de chaque côté du cou.

E. & C.—Le Butor se rencontre sur toutes nos grèves en été, particulièrement sur celles couvertes d'herbes. A l'encontre des Hérons, il niche sur le sol ou sur de petits arbrisseaux, mais comme chez eux aussi, la ponte se fait en société. On donne dans le bas du Fleuve, le nom de *Quac* au Butor, sans doute en raison de son cri qui imite assez ce son. La femelle pond 4 œufs d'un brun olivâtre.

(A continuer).