

et commode, d'un effet sûr et rapide. Il n'exige pas le repos de la malade, il présente sur le pansement à l'iodoforme l'avantage d'être inodore et exerce, en outre de son action curative, un effet analgésique marqué. Enfin, il amène dans la plupart des cas la disparition rapide des tuméfactions ganglionnaires avant que leur fonte purulente ait eu le temps de se produire.

VULVO-VAGINITE DES PETITES FILLES.

Permanganate de potasse au 1/4000 en augmentant jusqu'au 1/1000.

Injection avec une sonde molle jusqu'au fond du vagin, $\frac{1}{2}$ litre. 2 à 3 fois par semaine.

DE LA VAGINITE SEBORRHEIQUE ET DE SON TRAITEMENT.

Sous le nom de *séborrhée vaginale*, M. le docteur P. F. Strassmann, assistant de la polyclinique gynécologique de la Faculté de médecine de Berlin, désigne une forme particulière de catarrhe du vagin qui s'observe le plus souvent chez les femmes obèses, chez les vieilles filles et aussi pendant la grossesse. Cette affection, qui peut être considérée comme une simple augmentation de la sécrétion normale du vagin, se manifeste par un écoulement peu abondant et épais composé surtout de grumeaux graisseux blanchâtres dans lesquels on trouve de l'épithélium pavimenteux en masses. Elle guérit rapidement sous l'influence d'injections vaginales pratiquées avec l'eau tiède additionnée d'une cuillerée à bouche de bicarbonate de soude.

IMPUISSANCE SEXUELLE CHEZ LA FEMME.

Extr. de chanvre Indien	} à 2 gr.
Extr. de noix vomique	
Extr. aqueux d'aloès	60 cent.

Mélez et faites 100 pilules. Dose: 2 ou 3 pilules par jour.

PRURIT VULVAIRE.

Sublimé	0 gr. 40 cent.
Alun	8 gr.
Amidon	40 gr.
Eau	1 litre

Usage externe.
