

L'ALTISE TRIANGULAIRE, (*Disonychia triangularis* Say.)

Cette puce de terre fait quelquefois des ravages dans l'Ohio, le Michigan et d'autres Etats de l'Union américaine, spécialement parmi les navets. C'est un insecte commun au Canada, nous en avons reçu plusieurs fois du Manitoba où il avait fait son apparition dans les champs de blé ; mais on n'a jamais constaté qu'il ait fait tort à cette plante.

Cette variété présente un aspect très semblable à celui de l'altise de l'épinard, mais est légèrement plus grosse et porte trois petites taches sur le thorax qui est jaunâtre.



FIG. 3.—Thorax de l'altise triangulaire montrant la position des taches, considérablement agrandi. (original)

L'ALTISE DE L'AULNE, (*Haltica binarginata*) Say.

On nous signale quelquefois des dommages faits par cet insecte à l'aulne, au peuplier et au saule, dans tout le Canada—on en a trouvé en effet en Nouvelle-Ecosse à l'est, en

Colombie-Britannique à l'ouest, et au nord jusqu'à Fort-Simpson et le fleuve McKenzie.

Il y en avait des quantités sur les saules à Red Deer, Alberta, en 1898. Cet insecte mesure à peu près $\frac{1}{2}$ de pouce de longueur et est de couleur bleu-pourpre.



FIG. 4.—Altise de l'aulne, grosse 4 $\frac{1}{2}$ fois; (original)

L'ALTISE DE LA VIGNE, (*Haltica chalybea* Ill.)

Il arrive souvent que les jeunes bourgeons de la vigne sont complètement dévorés par ces insectes qui pullulent au commencement du printemps, au moment où ils sortent de leurs quartiers d'hiver. Leurs ravages peuvent même quelquefois faire sécher les ceps. Cet insecte a fait beaucoup de tort aux vigneron de certaines parties de l'Ontario. Il mesure $\frac{1}{2}$ de pouce et sa couleur varie entre le bleu




FIG. 5.—L'altise de la vigne: a, adulte grossi 7 fois; à droite, patte de derrière grossie; b, larve grossie 6 fois; c, larves et altises sur les feuilles—grosseur naturelle; d, altise en train de manger un bourgeon; e, altises malades. (D'après Marlatt, Minist. Agr. des E.-U.)