

Cette variété se présente sous l'aspect d'une tuberculose péritonéale localisée. Il s'agit de ces formes qui occupent une partie plus ou moins considérable du ventre, se présentant sous l'aspect de grosses tumeurs qui, par leurs sièges anormaux, offrent les caractères les plus troublants et prêtent aux erreurs de diagnostic les plus diverses.

Mais des 25 observations que Merry a pu retracer, presque toutes ont rapport à des tumeurs, formées par des noches ascitiques limitées par des adhérences multiples au pelvi-péritoine, et semblant avoir comme point de départ un organe de la région ; cinq de ses observations seulement ont quelque analogie avec la forme toute particulière qui nous intéresse plus spécialement.

* * *

Les faits sur lesquels nous désirons attirer l'attention ont rapport à une forme de péritonite tuberculeuse localisée, dont nous avons rapporté un cas, en 1905, dans l'UNION MÉDICALE, sous le titre de "péritonite déformante". Depuis cette époque, la bonne fortune de la clinique nous a fait réunir quatre observations personnelles, dont une avec pièces nécropsiques, qui nous permettent d'étudier cette question dans ses détails.

Cette péritonite tuberculeuse localisée évolue d'une façon essentiellement chronique et ce qui en constitue le caractère clinique primordial : c'est qu'elle se présente sous l'aspect de grosses tumeurs abdominales que l'on diagnostique pour toute autre affection que la vraie, et que l'on confond généralement avec les tumeurs et les néoplasmes des organes de la région. C'est ainsi que dans un des cas que nous rapportons, la lésion péritonéale avait été confondue, même après la laparatomie, avec un gros kysté de l'ovaire ; dans un autre cas, nous avons diagnostiqué : néoplasme du mésentère ; puis chez d'autres : tumeur rénale, fibrome utérin, sarcôme de la paroi abdominale, etc.

Pour que cette forme de péritonite prête à tant d'erreurs, il faut donc qu'elle ait des caractères bien particuliers et différents des autres formes. En effet, nous sommes généralement en présence d'une tumeur, mate, bien localisée, limitée, facilement circonscrite, fixe ou quelquefois mobile ; à la laparatomie nous trouvons une tumeur, lisse et vernissée, indépendante du reste de la cavité abdominale, qui ne contient ni épanchement ascitique, ni granulation.