

pareilles précautions hygiéniques et pareilles mesures de désinfection si indispensables sont observées.

MEDECINE PRATIQUE

Traitement de la dysenterie infantile.

(VEILLARD).

Le médicament vraiment spécifique de la dysenterie infantile est l'ipéca. On l'emploiera de préférence suivant la méthode suivante :

Poudre d'ipéca 25 grains.

Faites bouillir cinq minutes dans 4 onces d'eau. Filtrez et ajoutez :

Laudanum de Sydenham..... II à IV gouttes.

Eau distillée de cannelle..... 2½ drachmes.

Sirop de fleurs d'oranger..... 5 drachmes.

Pour un enfant de trois ans.

Par cuillerée à dessert, d'heure en heure ; s'il survient des nausées ou vomissements on espace davantage les cuillerées. Cette potion, pour agir, doit être tolérée ; c'est pour cette raison qu'on y ajoutera toujours une certaine quantité d'opium et qu'on surveillera attentivement les effets pour s'opposer aux vomissements.

Cette préparation, légère modification de celle indiquée par Delieux de Savignac, se fait plus rapidement que celle connue sous le nom d'*Ipéca à la brésilienne*.

Voici la formule de cette dernière (pour adulte) :

Prenez 2 drachmes d'ipéca concassé ; mettez-les infuser dans 6½ onces d'eau, filtrez, et administrez par cuillerée à bouche ces 6½ onces le premier jour ; le deuxième jour, reprenez ces 2 drachmes qui ont servi et faites-les infuser dans 4 onces d'eau, décantez une deuxième fois et prenez cette infusion le deuxième jour ; le troisième jour, toujours sur ces 2 drachmes, versez 4 onces d'eau bouillante, ne décantez pas, mélangez le bois avec le liquide ; le malade prend le tout par cuillerées à bouche ; si les garde-robes ne sont pas modifiées, vous recommencerez cette série jusqu'à ce que la bile paraisse dans les selles.

Autre formule.

Ipéca pulvérisé..... 25 grains.

Infusez 5 minutes dans :

Eau distillée..... 4 onces.