

Elle survenait sans être annoncée par aucun prodrome ; apparaissant et disparaissant sans produire de douleurs.

Quelques mois avant d'être sous nos soins, notre malade, au milieu d'une bonne santé avait eu de l'hématurie. On peut la comparer à ces hémoptisies précoces qui laissent prévoir la tuberculose pulmonaire.

Dans le mois de novembre, 1903, nous avons observé deux cas d'hématurie.

Un jeune homme de 22 ans, descendant d'une mère morte de tuberculose pulmonaire, avait une hématurie considérable. Il n'a présenté aucun autre symptôme du côté des voies urinaires.

Cette hémorrhagie paraît pré-tuberculeuse et due à une congestion rénale.

Le 20 novembre, nous étions appelés auprès d'un vieillard de 82 ans.

A 4 hrs a. m., il était éveillé par une douleur atroce dans la région rénale ; s'irradiant à l'abdomen, à la vessie, à la région inguinale et au scrotum.

Une heure après ce vieillard avait une hématurie abondante due à un calcul.

Le lendemain, Mr X... avait une rétention d'urine. La masse sanguine, coagulée venait faire bouchon dans le col.

Nous introduisons vainement la sonde vésicale, nous tentons inutilement de fragmenter les caillots en promenant la sonde en tout sens. De même, les lavages demeurent insuffisants.

Nous pouvons enfin retirer des caillots en grande quantité en adaptant à la sonde vésicale un aspirateur. L'adrénaline paraît ensuite avoir contribué au rétablissement de notre malade.

A propos de l'adrénaline, le Dr Lange, de St-Louis prétend avoir arrêté une hématurie due à une tumeur vésicale en donnant 15 gouttes de la solution normale toutes les 5 heures.