

LE
Naturaliste Canadien

Vol. VI.

CapRouge, Q., JUIN, 1874.

No. 6.

Rédacteur : M. l'Abbé PROVANCHER.

FAUNE CANADIENNE.

LES OISEAUX.

(Continuée de la page 133).

5 Gen. XÈME. *Xema*, Leach.

Bec court, un peu grêle et comprimé ; mandibule supérieure droite à la base, courbée à la pointe ; narines linéaires et latérales. Ailes longues, pointues ; queue fourchue ; tarses forts ; doigts unis par une membrane complète, le postérieur court.

Le Xème de Sabine. *Xema Sabinii*, Bruch ; *Larus Sabinii*, Sab.—Vulg. *Le Goëland à queue fourchue* ; Angl. *Fork-tailed Gull*.—Long. 13½ pouces ; ailes 11 ; queue 5 ; bec 1 ; tarses 1. Tête et haut du cou d'un gris noirâtre terminé par un anneau noir, le reste du cou, le dessous, les couvertures caudales supérieures et la queue, d'un blanc pur. Le dos et le dessus des ailes d'un gris bleuâtre. Bord de l'aile à partir du coude, noir ; les 5 premières primaires noires avec l'extrémité blanche ; les secondaires largement terminées de blanc ; bec noir à la base, jaune dans le reste ; bords des paupières avec les angles intérieurs de la bouche, rouge vermillon ; pieds noirs.

E. R.—Ce Goëland qui appartient proprement aux mers boréales, se montre assez rarement dans les eaux du Golfe.

III. Sous-Fam. des STERNINES. *Sterninae*.

Bec un peu long, généralement grêle, droit, quelquefois avec la mandibule supérieure recourbée à l'extrémité ; narines linéaires ; ailes longues, les primaires allongées et