

1904, jour où, à 10 heures du matin, le premier accès éclamptique éclate. On avait déjà employé sans succès tous les moyens ordinaires contre l'urémie.

Le 1er janvier Edebohls pratiqua la décapsulation des deux reins. Le rein gauche était grossi de 50 p. 100 de son volume ordinaire. Sa capsule était épaissie, forte, mais lâchement unie à l'organe, assez lâche pour être plissée. La capsule détachée fut excisée *in toto*. Le rein droit était moins augmenté de volume. Diagnostic: néphrite parenchymateuse droite et gauche, aiguë ou subaiguë.

Durant les 24 heures précédant l'opération, il n'y eut que 360 centimètres cubes d'urine d'émis. Durant les 24 heures après l'opération, il y eut suppression presque complète de l'urine, 30 centimètres cubes seulement d'urine gélatineuse, semi-solide, couleur café, obtenue par le cathétérisme. Cependant l'état de la femme s'améliora. Après ces dernières 24 heures l'urination était abondante. L'accouchement (gémellaire) se fit spontanément 48 heures après l'opération. Le début de la dilatation fut marquée par 3 faibles convulsions. Durant les premiers jours du post-partum, se produisit un vrai déluge urinaire. Quatre semaines plus tard la femme complètement guérie avait repris ses occupations.

Edebohls termine ainsi sa communication: "Le fait parle de lui-même. Ce qui s'en dégage nettement, ce qui est indiscutable, c'est que *la décapsulation du rein peut arrêter les progrès de l'urémie et les accès convulsifs d'origine puerpérale chez la femme non délivrée*. Conclusion manifeste: la provocation de l'avortement ou de l'accouchement prématuré, avec tout ce que ces méthodes thérapeutiques comportent pour la mère et pour l'enfant, ne doit plus être tenu pour notre dernière ressource dans le traitement de l'éclampsie puerpérale."

Le 23 juin 1906 dans un journal allemand, Edebohls a rapporté une troisième observation concernant encore une primipare de vingt ans qui, le lendemain de son accouchement à terme, fut prise d'accès éclamptiques. Elle eut sept grands accès et plusieurs de moindre importance. Les urines, albumineuses, contenaient des cylindres et 2gr. 50 centigr. seulement d'urée. La malade fut opérée cinq heures après les premiers accès convulsifs. Les