

Mixture contre les vomissements dus au cancer de l'estomac.

—M. A. ROBIN.

Pricotoxine	} 44 0 gr. 05 centigr.
Chlorhydrate de morphine }	
Sulfate neutre d'atropine.....	0 " 01 "
Eau de laurier-cerise.....	10 grammes.

F. S. A.—Prendre, cinq à dix minutes avant chaque repas, cinq à huit gouttes de cette solution.

Mélange pour l'antiseptie intestinale.—M. J. DE MAXIMOVITCH.

Naphtel a.....	3 grammes
Chloroforme.....	XV gouttes
Huile de ricin.....	100 grammes
Essence de menthe poivrée	V Gouttes

Mélez.—A prendre par cuillerées à bouche dans du vin de Porto, de la bière ou du café noir chaud et sucré. Chez les enfants, cette préparation sera administrée par cuillerées à café.

Mixture contre les contractions utérines spasmodiques survenant pendant le travail.—M. P. MULLER.

Teinture d'iode.....	2 grammes.
Alcool	4 "

Mélez.—Prendre toutes les demi-heures cinq gouttes de cette solution dans un demi-verre d'eau chaude.

Le spasme utérin cesserait, dans la plupart des cas, dès la seconde ou la troisième dose ; mais parfois on serait obligé, pour obtenir ce résultat, d'administrer la teinture d'iode alcoolisée une quatrième et même une cinquième fois.

Plus tôt ce traitement est institué, plus il se montrerait efficace.