

est représentée de grandeur naturelle, et où la tête, vue de côté, est très-grossie.

Se trouve dans les intestins des moutons, même naissans.

*Tænia du cheval, Tænia equina.*

Tête quadrangulaire, avec quatre trous; les articulations larges et courtes, les stigmates invisibles.

*Pallas*, Beytr. 1. tab. 3. fig. 20. *Goeze*, Eingew. tab. 25. B. fig. 11, 13. *Batsch*, Bandw. fig. 137, 138. *Chabert*, Traité des Mal. Verm. tab. 2. fig. 1. Ency. pl. 43. fig. 12, 13, 14.

Se trouve dans les intestins des chevaux.

*Tænia du cochon, Tænia suis.*

*Pallas*, Spic. Zool. 2. tab. 3. fig. 13.

Se trouve dans les intestins des cochons d'Ethiopie.

*Tænia globifère, Tænia globifera.*

Les premières articulations rhomboïdales; les suivantes ovales et pyriformes; les dernières globuleuses et pétiolées.

*Goeze*, Eingew. tab. 32. A. fig. 13, 16. *Bloch*, Eingew. tab. 3. fig. 5, 7. *Batsch*, Bandw. fig. 119, 121, 134, 136. Encycl. pl. 48. fig. 1, 2, 3.

Se trouve dans les intestins des faucons.

*Tænia perlé, Tænia perlata.*

La tête quadrangulaire; les articulations carrées, avec le bord aigu, et le nœud du milieu blanc, semblable à une perle.

*Goeze*, Eingew. tab. 32. B. fig. 17, 23. *Batsch*, Bandw. fig. 73, 75. Encycl. pl. 48. fig. 5 à 11.

Se trouve dans les intestins de la buse.

*Tænia fouet, Tænia flagellum.*

La partie postérieure très-large, et se transformant