

Pour assurer le repos de l'organe, on peut recourir à une piqure de morphine.

Si l'on décide une action directe, on donne l'ergotine, 1 à 4 gr. en potion par 24 heures; l'adrénaline 5 à 30 gouttes de la solution à 1/000, ou le chlorure de calcium, 4 gr. C'est un des meilleurs hémostatiques de l'estomac.

Hématémèse de moyenne intensité.—Le traitement est le même, si ce n'est que l'on peut y mettre moins de ménagement. On a essayé en plus la gélatine, 1 à 40 c.c. d'une solution à 10%. Lorsque ces hématémèses se prolongent ou se répètent, on pourra proposer l'intervention chirurgicale. La gastro-entérostomie et la résection de la partie ulcérée donnent de brillants résultats.

Traitement causal: Hématémèses dues à des lésions de l'estomac.

Ulcère de l'estomac.—Le plus souvent, c'est un vaisseau de calibre inférieur qui saigne, et il en résulte une hémorrhagie rarement mortelle. Repos absolu, tête basse, glace ou compresses froides sur le ventre. Toute nourriture sera supprimée pendant deux jours au moins. Un peu de glace. Il vaut mieux administrer les médicaments par la voie rectale ou sous-cutanée.

Par la voie rectale: lavements chauds à 48-50° et lavements ou suppositoires avec ergotine, adrénaline, chlorure de calcium.

Par la voie sous-cutanée, on relèvera la tension artérielle par des injections de caféine, d'éther, d'huile camphrée, de sérum artificiel, 300 gr. en une fois avec 25 à 50 centigr. de caféine, ergotine, ergotinine, adrénaline.

L'hémorrhagie calmée, ou à peu près, on peut agir directement sur la partie qui saigne par l'ergotine, l'adrénaline et surtout par le chlorure de calcium, 3 à 4 grammes. Pour immobiliser l'estomac on donnera de l'extraît thébaïque, 0.01 toutes les ½ heures jusqu'à 8 à 10 centigr. On donne encore avec succès la solution de gélatine à 10%.

L'hémorrhagie arrêtée, on fait le pansement de la muqueuse avec le bismuth, 10 à 15 grammes dans 120 gr. d'eau gommeuse à prendre dans les 24 heures ou avec l'antipyrine:

Antipyrine	1 gr.
Bicarbonate de soude	0.50 cgr.
Pour 1 paquet—1 à 3 en quelques heures.	
ou Taunin en poudre	0.60 cgr.
Opium brut	0.20 cgr.
Sucre pulvérisé	6 cgr.
Pour 10 paquets—1 toutes les 2 heures.	

Puis alimentation liquide, lactée pendant longtemps. Dans les premiers temps on ajoute à chaque verre de lait une cuillerée à soupe d'eau de chaux, qui se transforme en chlorure de calcium et qui ajoute ses effets