

membraneux très large. Extrémité du bec relevée et terminée par un crochet recourbé. Queue molle.

Les Fuligulines, qu'on appelle aussi *Canards de mer*, présentent, peut être plus que tous les autres encore, une grande similitude dans leur conformation, de sorte que les couleurs sont, le plus souvent, le moyen le plus sûr pour les distinguer. La clef suivante peut cependant aider à séparer les différents genres.

*Clef pour la distinction des genres.*

- Bec avec une protubérance à la base latéralement et en dessus, se continuant en arrière aussi loin que l'angle de la bouche ;  
 Crochet petit, étroit, et n'occupant que le milieu de l'extrémité du bec ;  
 Bec plus long que la tête ;  
 Narines en arrière du milieu du bec. 1. FULIX.  
 Narines au milieu du bec ou très peu en arrière..... 2. AITHYA.  
 Bec plus court que la tête..... 3. BUCEPHALA.  
 Crochet très large, occupant toute l'extrémité du bec..... 4. HISTRIONICUS.
- Bec sans aucune protubérance à la base aux côtés, ou ne s'étendant pas aussi loin en arrière que l'angle de la bouche ; les plumes du front s'étendant plus en avant en dessus qu'aux côtes ;  
 Bec sans aucune gibbosité à la base ;  
 Plumes des joues, ordinaires ; queue très longue ..... 5. HARELDA.  
 Plumes des joues raides ; queue courte.. 6. CÀMPTOLÆMUS.
- Bec gibbeux à la base ; narines en avant du milieu ;  
 Couleur toute noir : plumes du front ne dépassant pas la base de la gibbosité. 7. OIDEMIA.  
 Couleur variée de noir et de blanc ; plumes du front s'étendant assez loin en avant ;  
 Couleur noire, avec taches blanches sur la tête..... 8. PELIONETTA.