

avec une échancrure profonde et étroite. Antennes assez courtes, entièrement noires. Mandibules ferrugineuses à l'extrémité. Écailles alaires roussâtres. Ailes hyalines-jaunâtres. Pattes rousses, les antérieures avec une ligne noire en dessus; les hanches noires, les 2 premières paires blanchâtres à l'extrémité en avant. Abdomen déprimé, large, peu allongé, roux avec les 4 premiers segments noirs. Valves de la tarière rousses.—Capt. Geddes (Montagnes-Rocheuses).

Voisine de la *semirubra*, Nort., mais s'en distinguant par l'échancrure de son chaperon, sa taille plus petite et plus ramassée, ses 4 pattes postérieures entièrement rousses, etc.

**28. Tenthrede noire-bleuâtre.** *Tenthredo atrocærulea*, n. sp.

♀—Long. .50 pec. D'un brun noir-bleuâtre, surtout à l'abdomen. Le chaperon, le labre et les mandibules excepté à l'extrémité, blanc. Pattes rousses, avec les hanches, les trochanters et la base des cuisses, noir, les cuisses antérieures avec une ligne noire en dessus. Abdomen allongé, robuste, brillant, noir-bleuâtre sans aucune tache. Ailes légèrement obscures—Ontario (Geddes).

Bien distincte par sa coloration.

**29. Tenthrede à-ventre-pâle** *Tenthredo ventralis*, Say.—*Allantus ventralis*, Say, Proc. Am. Ent. Soc. II, 230.

♀—Long. .45 pec.—Noire tachée de blanc; la face au dessous des antennes, le chaperon, le labre, les mandibules, les joues, de larges lignes orbitales pénétrant jusque sur le vertex, les écailles alaires, les bords latéraux et les angles inférieurs du prothorax, une tache sur les flancs, une autre au-dessus des 4 hanches postérieures, l'extrémité de la poitrine, les 4 pattes antérieures avec leurs hanches excepté en dessus, blanc. Les pattes postérieures noires avec l'extrémité des hanches, la base des cuisses, un large anneau à la base des jambes, blanc. Abdomen d'un noir brillant en dessus, avec le ventre d'un blanc sale. Ailes hyalines, les nervures noires.—Ottawa (Harrington).

#### EXTRA LIMINA.

**Tenthrede cuisses-rouges.** *Tenthredo erythromera* n. sp.