

na doorschijnend. De lichaamschijf mat een' duim in de doorsnede, de vangers bij de twee duimen.

Hetgeen ik van de varieteiten der veellen gezegd heb, moet ik ook hier herhalen. De *Porpita nuda* (*) is vermoedelijk een van zijne vangers be-roofd individu, gelijk wij er ook gevangen hebben, naardien de vangers zeer ligt aan het net blijven hangen en afscheuren. De *Porpita appendiculata* (†) is eene gewone door kleine kreeften verminkte *Porpita*, bij wie van de uiterste huid des rands slechts nog drie fragmenten zijn overgebleven; ook zoodanigen zijn ons voorgekomen. De *Porpita glandifera* (§) geeft de beschrijving van een onbeschadigd individu, gelijk ook de *Porpita gigantea* (°), die ik, wanneer het overigens bepaald zoo is, door de blaauwe kleur der vangers van de vorigen onderscheiden kon.

Tot besluit wil ik nog aanmerken dat de Physalën buiten de zuigmagen slechts met vangarmen, de veellen slechts met voeldraden, doch de Porpiten met beiden begaafd zijn.

EINDE DES DERDEN EN LAATSTEN DEELS.

(*) *Hist. nat. des anim. sans vertèbres, par LAMARCK, Tom. II. pag. 484. n° 1.*

(†) *Ibid. n° 2.*

(§) *Ibid. n° 3.*

(°) *Ibid. n° 4.*