

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 563

6. TEUCRIUM foliis tripartitis linearibus, racemo terminali, caule repente. *nissolianum*
Teucrium repens, folio trifido. *Nissol.*
Habitat - - -
Folia tripartita, linearia, glabra. Flores in racemo terminali, oppositi, pedunculati.
7. TEUCRIUM foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus.
Teucrium foliis lanceolatis obtusis dentatis, floribus solitariis sessilibus. Roy. lugdb. 306. Sauv. monsp. 141.
Chamaepitys moschata, foliis serratis. Bauh. pin. 249.
Chamaepitys spuria prior. Dod. pempt. 47.
Anthyllis altera. Clus. hist. 2. p. 186.
Habitat in Lusitania, G. Narbonensi, Monspelii.
8. TEUCRIUM foliis pinnato-multifidis, caule simplicissimo erecto, bracteis subulato-palmatis. *mauritanian.*
Teucrium, delphinii folio, non ramosum. Shaw. afric. 575. t. 575.
Habitat in Mauritania.
9. TEUCRIUM foliis integerrimis oblongo-ovatis petiolatis: supra glabris subtus tomentosis.
Teucrium foliis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, floribus solitariis pedunculatis. Hort. cliff. 302. Roy. lugdb. 305.
Teucrium peregrinum, folio sinuoso. Bauh. pin. 247.
Teucrium fruticans beticum. Clus. hist. 1. p. 348.
Habitat in Betica, Sicilia maritima. 5
10. TEUCRIUM foliis integerrimis rhombeis acutis villosis: subtus tomentosis. *latifolium.*
Teucrium fruticans beticum, ampliore folio. Dill. elsh. 397. t. 284. f. 367.
Teucrium beticum humilior & ramosius, folio subrotundo. Hort. angl. t. 3.
Habitat in regione Betica. 5
11. TEUCRIUM foliis lanceolato-linearibus integerrimis, racemo subspicato.
Teucrium foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus, floribus solitariis pedunculatis. Hort. cliff. 303. Hort. upf. 150. Mat. med. 286. Roy. lugdb. 307.
Polium angustifolium creticum. Bauh. pin. 221.
Rosmarinum strechados facie. Alp. exot. 103. t. 102.
Habitat in Creta. 5