

## PANSEMENT

Si l'extraction a été facile et qu'il n'y a aucune réaction inflammatoire ; instiller deux gouttes du collyre suivant :

Collargol ..... 0.50 ctgrammes

Eau distillée stérilisée ..... 10. grammes

et avertir le malade si le lendemain il y a la moindre douleur ou inflammation de revenir le lendemain ; sinon il est inutile de revenir.

S'il y a une plaie cornéenne, mettez un pansement occlusif, prescrivez au malade le collyre ci-haut nommé : deux gouttes toutes les six heures et si après deux ou trois jours au moins tout inflammation cornéenne est disparue, enlevez le pansement et tout ira bien.

## COMPLICATIONS

Quand un malade vient vous voir avec sa cornée toute infiltrée autour du corps étranger et un ulcère cornéen en voie de formation ; ou même s'il y a déjà du pus dans la chambre antérieure ; je crois que la seule chose à faire c'est de lui mettre un pansement occlusif et de l'envoyer immédiatement là où il pourra être sous les soins d'un spécialiste de manière à avoir les soins assidus et qui souvent nécessiteront des pansements toutes les deux heures.

Je crois que c'est la meilleure chance que peut courir notre malade à moins que vous soyiez en état de lui donner les soins appropriés et qu'il soit constamment à votre portée.

DR J. VAILLANCOURT.

—:O—O:—