

*Pronostic.*—Les paralysies du voile du palais sont moins graves et moins durables que celles des membres et du tronc; encore faut-il compter plusieurs semaines de traitement. *En général la guérison intégrale finit toujours par survenir*; il n'y a pas d'exemple de paralysie devenue définitive. Cependant on peut avoir un pronostic variable suivant la localisation; les paralysies sont bénignes dans les formes limitées de diphthérie et guérissent en 8 à 20 jours, tandis qu'elles sont plus graves dans les formes généralisées de diphthérie. Bien qu'elles puissent guérir en 3 ou 4 mois dans ces dernières formes, il faut savoir qu'elles peuvent aussi se terminer par la mort (asphyxie ou syncope, etc.). Lorsque la paralysie diphthérique reste localisée au pharynx l'état général des enfants est ordinairement bon. Au contraire dans les paralysies généralisées le sujet est pâle, asthénique et souvent albuminurique. La mort, lorsqu'elle survient, arrive par asphyxie due à la paralysie des mouvements respiratoires, ou par inanition due aux difficultés de l'alimentation, ou par cachéxie générale due à une intoxication de l'organisme par le poison diphthérique, ou par broncho-pneumonie due à la pénétration d'aliments septiques dans le larynx, ou par syncope (Apert).

*Marche habituelle des paralysies diphthériques.*—Le début a lieu presque toujours par la partie qui a d'abord été atteinte de diphthérie. Elle commence par la gorge le plus souvent, ainsi que nous l'avons déjà dit, à cause de la fréquence de l'angine; mais elle peut commencer par le larynx en cas de croup d'emblée, et par les membres en cas de diphthérie (cutanée) des membres. Sauf la paralysie de la gorge qui peut rester localisée à cette région, la paralysie dite diphthérique se généralise ordinairement à un territoire d'une étendue variable; la généralisation est presque toujours assez tardive et n'apparaît que plusieurs jours après la première localisation (Marfan)

*Durée.*—La durée varie entre quelques jours et quelques mois. Si la paralysie de la gorge seule a souvent une durée assez courte: 20 jours en moyenne; la paralysie généralisée au contraire dure de 2 à 6 mois.

*Diagnostic.*—Le diagnostic de la paralysie diphthérique n'offre pas en général de difficulté à l'observateur instruit. Son syndrome est caractéristique: *une paralysie débutant par la gorge, atteignant ensuite les muscles des yeux, ceux des membres inférieurs, ceux de la nuque et du tronc, paralysie flaccide avec abolition des réflexes tendineux ne peut être produite que par une cause spécifique, toujours la même, la diphthérie* (Marfan). Le syndrome paralytique que nous venons de décrire est tellement caractéristique que lorsqu'on le constate chez un sujet dont l'histoire antérieure est inconnue ou obscure, il permet à coup sûr le diagnostic rétrospectif de diphthérie.