

Mais il revient à la seconde grossesse et encore aux suivantes : cette réapparition est la règle générale bien qu'elle manque quelquefois. Bien plus, tandis que, lors des premières atteintes, le mal s'éteint quand l'état puerpéral a cessé, il finit par s'installer définitivement, à mesure que les grossesses se multiplient et par persister entre deux quelconques d'entre elles.

Vous voyez combien cet herpès gestationis est moins grave que l'impetigo herpétiforme : toute femme touchée par ce dernier ne l'aura pas deux fois puisqu'elle meurt du premier coup.

L'herpès gestationis est un pemphigus : ses bulles n'ont vraiment pas l'aspect des pustules miliaires de l'autre maladie. Je sais bien qu'on signale dans l'herpès gestationis un certain polymorphisme, mais il n'y a là qu'une apparence. S'il présente des papules, ce ne sont que des bulles avortées, s'il présente des pustules, elles sont dues à l'infection pyogène secondaire des bulles primitives.

Enfin, l'herpès gestationis est une affection prurigineuse. Dans l'impetigo herpétiforme, au contraire, jamais de prurit : ce que les malades accusent, c'est de la douleur, causée par les lésions mêmes de la peau.

*Ecthyma. — Rupia.* — L'ecthyma commence par une tache rouge, qui se soulève au centre, sous forme d'une petite papule conoïde, rouge, enflammée, douloureuse, entourée d'une zone érythémateuse. — Dès le deuxième jour, le sommet devient jaunâtre, se soulève : au-dessous est une goutte de pus. Peu à peu, toute la saillie est envahie et la pustule est constituée.

Elle est grosse comme un pois, elle va jusqu'à se donner le diamètre d'une pièce de cinquante centimes. Elle est assez régulièrement arrondie, saillante, à base indurée, possède une auréole érythémateuse. Ce sont là les caractères de la pustule phlysacée.

Vers le septième jour, elle s'ouvre spontanément donnant issue à une « humeur » qui se concrète en une croûte aux caractères bien tranchés. Brune, épaisse, stratifiée, adhérente : voilà comme elle est, ne rappelant en rien la croûte melliforme et superficielle de l'impetigo. Elle finit par tomber, et laisse une cicatrice violacée, qui reste rouge assez longtemps et, à la longue se décolore.

Le *rupia*, variété d'ecthyma, est une affection rare, si on excepte le *rupia syphitique* (syphilide pustuleuse rupioïde). Le *rupia* est plus superficiel que l'ecthyma, mais il est plus large et sa cicatrice est plus grande. Le contenu de la bulle n'est pas