

contrions pour la première fois et que nous n'avons pas dans notre collection. C'était encore : *Calosoma frigidum*, Kirby, qu'on prend sur le mont St. Hilaire et qui ne se trouve pas à Québec; *Chauliognathus Pennsylvanicus*, De-Geer, *Necrophorus orbicollis*, Say, *Othosoma cylindricum*, Fabr., *Leptura proxima*, Say, *L. cheysocoma*, Kirby, *L. pubera*, Say, *Acilius fraternus*, Harris, etc.

Nous trouvons parmi les Hyménoptères : 3 spécimens femelles de *Talessa atrata*, Fabr., dont la tarière ne mesure pas moins de quatre pouces et demi, *Ichneumon mimicus*, Cress., *I. fortis*, Prov., *I. comes*, Cress.; *Ephialtes occidentalis*, Cresson, *Attractodes Cloutieri*, Prov., *Pelopus cyaneus*, Dahlb., avec son beau bleu métallique, *Anagophila communis*, Cress., *A. mediata*, Cress., *Amm. gracilis*, Lepelletier, c'est la première mention, pensons-nous, de la capture de cet insecte en Canada; nous en avons pris quelques spécimens en Géorgie où ils étaient encore assez rares; *Megachile centuncularis*, Cress., *Caelioxys conica*, Linn., *Eumenes fraterna*, Fabr., encore un insecte qui ne se rencontre pas à Québec, etc., etc.

Nous notons parmi les Névroptères une *Corydalus cornuta*, Fabr., *Phryganea vestita*, Walk. *Phryg. interrupta*, Walk. *Chauliodes pectinicornis*, Linn., etc.

Les Hémiptères nous montrent : *Cicada rimosa*, Say, un superbe spécimen ♂; nous en avons nous-même capturé un spécimen ♀ cette année même au CapRouge. Cette Cigale, qui a d'abord été découverte dans le Kansas, était réputée n'appartenir qu'à cette contrée, et voilà qu'on la trouve jusqu'à Québec même. Comparé avec un spécimen qui nous vient du Nébraska, le ♂ trouvé à St. Hyacinthe présente les différences qui suivent : taille un peu plus forte (1.30 pouce), hypostome entièrement noir, sans trace de roux sur les bords, dessous presque entièrement glabre, les taches roussâtres à peine lavées de verdâtre, épines des jambes postérieures en deux séries de quatre à peu près équidistantes. Sa coloration étant la même, nous ne pensons pas que ces différences, puissent constituer une espèce différente. La femelle prise par nous au CapRouge mesure 1.55 pouce, elle est beaucoup plus villeuse en dessous, ses