

Gerippte Feige. W.

Habitat in India orientali. h.

* 19. *FICUS lucida*. †

F. foliis ovatis cordatis integerrimis glabris obtusis basinerviis, ramis erectis. *Ait. Kew. 3. p. 451.*

Leuchtende Feige. W.

Habitat in India orientali. h.

* 20. *FICUS citrifolia*. W. †

F. foliis ovatis acutis integerrimis basi subcordatis superne nitidis glabris subtus pubescentibus, receptaculis ellipticis sessilibus geminatis. W.

Catou - alou. *Rheed. mal. 3. p. 73. t. 57.*

Citronenblättrige Feige. W.

Habitat in India orientali. h.

Receptacula *Cerasi magnitudine ecalyculata. Hanc ex descriptione et icone horti malabarici indicavi, quae sub F. indica tanquam synonymon est adducta, licet nullo modo huic similis.* W.

* 21. *FICUS martinicensis*. W.

F. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis apice attenuatis acutis basi rotundatis supra albo-punctatis. W.

F. (*virens*) foliis oblongis acuminatis integerrimis laevibus, basi angustato-rotundatis. *Ait. Kew. 3. p. 451.*

F. indica maxima, folio oblongo, funiculis e summis ramis demissis radices agentibus se propagans, fructu minore sphaerico sanguineo. *Sloan. jam. 2. p. 140. t. 223.*

Martiniquische Feige. W.

Habitat in India occidentali. h. (v. v. f. fl.)

Folia quadripollicaria vel semipedalia oblongo-lanceolata apice attenuata acuta, basi rotundata integerrima utrinque glabra. W.

* 22. *FICUS infectoria*. W.

F. foliis oblongis integerrimis apice attenuatis acutis basi rotundatis subcordatis supra impresso-punctatis, receptaculis globosis sessilibus calyculatis. W.

F. (*venosa*) foliis ovatis subcordatis acutis integerrimis laevibus supra punctato-impressis. *Ait. Kew. 3. p. 451.*