

REVUE DES JOURNAUX

Docteur GEORGES AUDET

Médecin-interne en chirurgie à l'Hôtel-Dieu

LA PRESSE MEDICALE

L'opothérapie en théapeutique infantile.—E. Apert, 29 mai 1920.

L'action sur l'organisme, des trois glandes à sécrétion interne, c'est-à-dire, les glandes thyroïdes, surrénales et l'hypophyse, peut ainsi se résumer :

Thyroïde.—Activation de la croissance et du développement sexuel parrallèlement l'un à l'autre et sans déviation hors du type normal.

Surrénale.—Activation du développement sexuel et des caractères sexuels accessoires, particulièrement du développement du système fibreux, avec tendance au virilisme et à l'obésité.

Hypophyse.—Activation de l'accroissement en hauteur de la taille, avec arrêt du développement sexuel et arrêt de la tendance à la soudure des cartilages d'accroissement.

En principe, l'opothérapie thyroïdienne trouvera son emploi dans les arrêts et retards uniformes du développement général; l'opothérapie surrénale sera indiqué dans les états languissants avec affaiblissement et apathie et croissance exagérée en taille; enfin l'opothérapie hypophysaire trouve ses indications dans les états inverses, chez les sujets trapus, ramassés sur eux-mêmes, obèses, hirsutes, ayant tendance à une puberté trop précoce.