

et froides, donnez-leur des oignons hachés et du charbon pilé deux fois la semaine. Un peu de teinture de fer dans les vaisseaux contenant leur eau (une cuillère à thé par deux pintes d'eau), et de temps en temps un peu de poivre de cayenne, comme stimulant, sont aussi de bons préservatifs.


La maladie commence par une difficulté dans la respiration, puis les narines se remplissent de mucus, les yeux et la face deviennent enflés, la gorge se remplit de chancre et la maladie est alors difficile à guérir.

En suivant les instructions plus haut données, lorsque vous découvrirez d'abord la maladie, vous la préviendrez neuf fois sur dix et l'oiseau sera sauvé.

HORTICULTURE.

Soins à donner au Potager et au Parterre en Juillet.


Le temps est arrivé où il faut mettre le céleri, repiqué au mois dernier, dans les fosses où il doit acquérir les qualités qui font qu'il rencontre tant d'amateurs. Ces fosses doivent avoir 18 pouces de profondeur, et on doit y mettre, avant de planter, 6 pouces de bon fumier, parfaitement pourri, mêlé d'à peu près le quart de son volume de sable. J'ai récolté le meilleur céleri possible dans ce terreau ainsi préparé. Cependant, les jardiniers de profession, donnent la composition du compost dans lequel on doit planter pour avoir le meilleur



Poulailler

Poulailler.

Nous donnons copie d'un poulailler très-commode, extrait du "Poultry Yard". Il est de 11 pieds sur 26. Le toit est à 4 pieds et demi du sol en arrière, à 8 pieds au milieu, et 2 pieds en avant. Le versant antérieur du toit est à un angle de 45 degrés.



Poulailler—Vue intérieur.

Dans la partie du toit qui fait face au sud sont pratiquées deux grandes fenêtres, de 4 pieds sur 6; ainsi qu'un ventilateur dont le haut est à charnières, et qui est maintenu dans n'importe quelle position au moyen d'une barre percée de trous de distance en distance et d'une cheville qui les traverse et se fixe dans le lambris. Le poulailler est divisé en deux par un filet en fil de fer, pour renfermer deux bandes séparées.

Il est construit en planches embouvetées, et recouvert à l'intérieur de papier feutré, ce qui en fait une bâtisse très-chaude. Les perchoirs sont à trois pieds du sol, et à un pied de la plate-forme qui reçoit les déjections, qui sont grattées et recueillies dans des boîtes qui se trouvent à l'extrémité de la plate-forme. Les nids sont placés sur un rang sous les juchoirs, ce qui économise l'espace.

Le diagramme ci-joint montre les dispositions de l'intérieur.

de mes lecteurs ou lectrices qui voudraient en profiter. Vous plantez votre céleri à six pouces de distance entre chaque pied, et il demande à être beaucoup arrosé les quinze premiers jours de sa transplantation, si la température est sèche. Tenez-le libre de mauvaises herbes, et vous n'avez pas d'autre soin à lui donner après le premier mois de croissance, que celui d'un léger rechauffage que vous faites par un temps sec, de même que toutes les façons que vous donnez au céleri. Vers le premier septembre, vous lui donnez un rechauffage beaucoup plus considérable que le premier, et qui doit lui donner l'apparence qu'il a dans la fig. 1. un mois après ce rechauffage, vous le rechauffez encore plus énergiquement, en tassant la terre jusqu'au bout des feuilles, tel qu'indiqué dans la figure 2, en ayant bien soin d'éviter de faire tomber de la terre dans le cœur de la plante. Après avoir

résultat, comme étant la suivante: une partie de tourbe (couenne), que l'on a mise en tas l'été précédent, pour la faire pourrir, une partie de fumier, copeaux, détritris de toute espèce, pourvu que le tout soit bien pourri, et une partie de boue de marais desséchée. Je donne cette indication pour le bénéfice de ceux