

Pratiqué pendant le travail, il efface les plus sombres chapitres de la pathologie obstétricale, chapitres qui nous faisaient fremir par l'exposé de ses erreurs navrantes de diagnostic. En effet, après avoir palpé l'abdomen d'une femme en travail, au début il deviendrait en général difficile de confondre une présentation des fesses avec celle de la face, celle de l'épaule avec la tête, celle du genou avec le coude, etc.

Pendant la délivrance, il nous met en garde contre toutes les surprises que l'évolution utérine peut nous ménager : inertie utérine, enchatonnement du placenta, hémorragie interne.

Certes l'obstétrique aura toujours des imprévues et l'on devra encore compter avec les présentations difficiles, les accidents multiples, mais ceux-ci seraient bien réduits si l'on prenait pour habitude de pratiquer le palper abdominal à bonne heure. On ne saurait donc trop engager ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec la méthode, de s'y mettre avec ardeur. Guidés par l'excellent livre de M. Pinard, ils auront acquis en peu de temps une expérience dont il n'auront qu'à se louer.

DR J. LESPÉRANCE.

Endométrite cervicale chronique.

Par M. le Docteur MELVILLE E. DE LAVAL, Lake Linden, Mich.

Quand une inflammation aigue affecte l'utérus, on remarque qu'elle envahit ordinairement cet organe en entier ; lorsque cette affection existe à l'état chronique elle est localisée et limitée au col utérin, cervix, ou bien au corps de l'utérus.

Cette limitation n'est pas absolue, car, dans certains cas, certaines parties de l'utérus (cavité utérine) sont plus ou moins affectées, tandis que, dans d'autres cas, l'utérus est envahi en entier et ce simultanément.

Ce que l'on est convenu, aujourd'hui, d'appeler endométrite cervicale chronique, est l'inflammation chronique de la membrane muqueuse cervicale, muqueuse qui tapisse le canal cervical.

D'après Thomas, cette membrane s'étend depuis l'os interne jusqu'à la portion vaginale (os externe) du col utérin qu'elle recouvre. Nonat considérant les différents symptômes qui accompagnent l'endométrite avait divisé cette affection en deux variétés suivant que le canal cervical seul ou la portion vaginale du col utérin était affecté.

Thomas considère l'endométrite comme une seule et même affection quelque soit la partie du cervix qui en soit affectée. Winkel et les autres gynécologistes font comme Thomas, vu disent-ils que l'endométrite cervicale peut affecter n'importe quelle partie du canal utérin.

On a décrit l'endométrite cervicale chronique sous les noms de catarrhe utérin cervical chronique, endométrite, leucorrhée cervicale.