

voler un nid sur la neige contenant trois petits presque parvenus à leur grosseur. La femelle pond de 4 à 5 œufs d'un vert bleuâtre tachetés d'orange au gros bout.

2. **Le Sizerin blanchâtre.** *Aegiothus canescens*. Cab. *Fringilla borealis*, Aud.—Angl. *The Mealy Redpoll*.—Longueur 6 pouces; queue $3\frac{3}{4}$ pouces. Bec court; corps renflé; ongles très longs; croupion blanchâtre, quelquefois lavé de rose; plumes largement marginées de blanc.

H. & AC. Sans être aussi commun que le précédent, on le rencontre assez souvent en hiver et au printemps, surtout dans les sucreries.

7. Gen. PLECTROPHANE, *Plectrophanes*, Meyer.

Bec conique, presque droit; mandibule inférieure plus haute et surtout plus large, à la base, que la supérieure; narines cachées par des plumes raides qui entourent la base du bec. Ailes pointues et très longues, atteignant presque l'extrémité de la queue; 1ère primaire la plus longue; tertiaires un peu plus longues que les secondaires; queue presque carrée ou légèrement échancrée. Tarses bien plus longs que le doigt médian; ongle du doigt postérieur très long et recourbé.



Fig. 8.

Deux espèces dans notre faune.

1. **Le Plectrophane des neiges.** *Plectrophanes nivalis*, Meyer; *Emberiza nivalis*, Linn.—Vul. *Oiseau blanc*; *Oiseau de neige*; Angl. *The Snow Bunting*.—Longueur $6\frac{3}{4}$ pouces; ailes $4\frac{1}{8}$; queue $3\frac{1}{2}$ pouces. Le noir et le blanc composent seuls la couleur de sa robe; milieu du dos, extrémités des secondaires et des tertiaires avec les 2 plumes du milieu de la queue, noirs; tout le reste d'un blanc pur. Pieds noirs. En hiver la tête et le croupion sont souvent d'un jaunâtre brun, avec