

SYPHILIGRAPHIE

Diagnostic du chancre syphilitique.—Clinique de M. le professeur FOURNIER à l'hôpital Saint Louis.—Les éléments de ce diagnostic sont les suivants :

1^o Attributs cliniques du chancre ; 2^o bubon.

1^o Les *attributs cliniques du chancre* sont d'abord :

a) D'être une lésion érosive plutôt qu'ulcéreuse. C'est une lésion de faible importance, presque insignifiante, absolument minime. Méfiez-vous donc de ces petites lésions que dédaignent les malades, qu'ils qualifient d'*écorchures*. Ce n'est rien : donc, méfions-nous. Ce peut bien être un chancre.

b) C'est une lésion *sans bords* à circonférence se continuant de plein pied avec les tissus sains.

c) C'est une lésion *lisse*, unie, quelquefois irisée.

d) C'est une lésion grise ou du rouge de la chair musculaire.

e) C'est une lésion doublée d'une *induration* spéciale, tantôt profonde, à noyau, ou noueuse ; tantôt étalée en ménisques et dite parcheminée ou foliacée suivant les cas.

2^o *Bubon* : Il présente une triade d'attributs qui sont les suivants :

a) C'est une lésion aphlegmasique :

b) Une lésion indolente ;

c) Une lésion le plus souvent multiple, *polyganglionnaire*.

99 fois sur 100, on peut avec ces deux ordres de signes faire le diagnostic. Il arrive cependant qu'on ne peut pas y arriver pour divers motifs : parce que le chancre a perdu ses caractères, parce qu'il a été altéré par des cautérisations, parce que le bubon n'a pas ses caractères cliniques ordinaires, etc. Il serait donc précieux, en pareil cas, d'avoir d'autres signes, d'autant plus qu'il s'agit ici de malades qui réclament un diagnostic *immédiat*.

Ces autres signes existent et sont au nombre de 3 :

1^o *Incubation* ; 2^o *Inoculation* ; 3^o *Confrontation*.

1^o Les inoculations expérimentales et les observations cliniques nous ont appris : a) que le chancre syphilitique incube toujours ; b) qu'il incube longuement, au minimum quinze jours, mais le plus souvent trois à quatre semaines. Il peut même encore paraître plus tard, trente, trente-cinq et quarante jours. Par conséquent, si un accident apparaît huit jours par exemple après le coït, ce ne peut être un chancre syphilitique. Si, au contraire, la lésion est apparue un mois après un coït suspect, il y a de grandes chances pour qu'on ait affaire à un chancre.