En juin 1890, je suis appelé auprès d'elle par le Dr M. qui l'a sous ses soins depuis longtemps.

Le Dr a employé tous les traitements ordinaires en pareil cas, il a été même obligé de pratiquer le tamponnement à chaque hémorragie. Etat actuel (juin 1890). Femme de taille moyenne, d'une maigreur effrayante, anémique, exsangue, très affaiblie, étant obligée de garder le lit la moitié du temps. Après l'avoir bien examinée, je conseille l'emploi de l'électricité (méthode Apostoli). Le lendemain, elle se rend chez moi en voiture, elle est si faible que je suis obligé de la faire reposer et la renvoyer chez elle, sans l'avoir même examinée.

Juin 19.—La malade revient aujourd'hui. Elle ne peut pas endurer la plus faible dose du courant continu. J'emploie alors la faradisation pendant 10 minutes, fil fin et long électrode bi-polaire d'Apostoli. Après cette faradisation, la malade se dit plus forte et ressent moins de douleurs.

Juin 23.—Nouvelle faradisation comme la première.

“ 26.—Faradisation suivie de 1^e galv. caust. posit. 40 milliamp. 4 minutes.

L'opération est encore douloureuse. elle n'aurait probablement pas été tolérée si elle n'avait été précédée de la faradisation.

Juin 30.—2^e Galv. posit. 50 milliamp. 5 minutes.

L'opération est assez bien tolérée.

Juillet 3.—3^e Galv. posit. 100 milliamp. 5 minutes.

La malade se dit beaucoup mieux, l'appétit et les forces reviennent, elle dort mieux. Le moral est aussi mieux.

Juillet 7.—La malade vient chez moi à pied pour la première fois, 4^e Galv. posit. 100 milliamp. 5 minutes.

La malade n'a pas ressenti de douleurs durant les deux dernières opérations.

Juillet 10.—L'amélioration se continue.

5^e Galv. posit. 100 milliamp. 5 minutes.

“ 14.—6^e “ “ “ “

“ 17.—7^e “ “ “ “

“ 21.—8^e “ “ “ “

“ 24.—L'amélioration se continue toujours. Le teint est meilleur, l'appétit est bon, la malade ne ressent plus aucune douleur. Elle engraisse beaucoup.

9^e Galv. posit. 100 milliamp. 5 minutes.

Juillet 28.—10^e Galv. posit. 100 milliamp. 5 minutes.

Août 4.—Elle n'a pas eu d'hémorragie depuis le commencement du traitement.

11^e Galv. posit. 100 milliamp. 6 minutes.