

Travaux Originaux

CHORIO-EPITHELIOMA *

Par Dr M. J. AHERN, M. D., membre de la Soc. Internationale de Chirurgie, etc.

Depuis 3 ans j'ai eu l'occasion de voir les cas suivants :

Mme J. L., de Campbellton, N. B., âgée de 44 ans et depuis 20 ans la femme d'un employé inférieur de chemin de fer, entre à l'Hôtel-Dieu de Québec le 14 février 1903.

Elle est envoyée par le Dr Pinault avec le diagnostic de cancer utérin ou déciduôme malin.

C'est une petite femme excessivement pâle et très faible.

La menstruation a débuté à 15 ans, revenait régulièrement tous les 28 jours, pendant 2 à 3 jours, accompagnée le premier jour d'un peu de dysménorrhée qui disparut après son mariage contracté à 17 ans.

Elle eut 12 grossesses dont 8 se terminèrent normalement à terme par des enfants vivants. Elle eut son premier à 18 ans et son dernier enfant à terme à 36 ans.

Ses accouchements ont été faciles et les suites de couches sans incidents pathologiques. A ses 4^e et 6^e grossesses elle avorta à 2 mois et 2 mois et demi.

En 1890, quand son dernier enfant avait 18 mois et qu'elle était au 8^e mois de sa 11^e grossesse, elle accoucha de ce que son médecin appela une môle, après quoi survinrent, à des périodes irrégulières, des métrorrhagies graves qui la gardèrent au lit pendant trois mois. De 1896 à 1902 elle fut bien réglée et eut bonne santé. En novembre 1902 elle se croyait enceinte n'ayant pas eu de règles en septembre ni octobre et éprouvant les ma-

* Travail lu aux Trois-Rivières, au 3^e congrès de l'Association des Médecins de langue française de l'Amérique du Nord.