ce propos, je vois encore ce brave tenancier d'un hôtel de campagne qui vint un jour à l'Hôtel-Dieu se faire opérer pour une fistule anale, comme d'habitude, consécutive à un abcès périanorectal. Or l'opération permit de constater que le trajet-fistuleux contenait un fragment de fémur d'un poulet du printemps, taillé en biseau à l'une de ses extrémités. Ce fragment était de robuste taille et mesurait 41/2 centimètres. Il avait silencieusement effectué la traversée du canal alimentaire et était venu échouer au port, en perforant le rectum entre les deux sphincters. Aub. le possesseur du fragment fémoral fut aburi de la découverte, n'ayant aucun souvenir de l'avoir avalé. C'était évidemment un glouton qui s'ignorait. Mais si en pratique on peut rencontrer des fragments osseux arrêtés dans l'œsophage, ce qui en somme est rare, beaucoup plus fréquents sont d'autres corps étrangers représentés par des pièces de monnaie, des boutons, des soufflets métalliques, ou en celluloide et des pièces de prothèse dentaire qui par leur dureté, leurs aspérités constituent un danger immédiat. Et encore ici, il importe de bien distinguer ceux à bords mousses et réguliers. comme les pièces de monnaie, de ceux à arrêtés vives, irrégulières de forme et parfois coupantes, comme les pièces de dentier. Ce sont ces dernières qui présentent en somme le plus d'intérêt, par les dangers que leur arrêt dans l'œsophage fait immédiatement surgir et à cause des difficultés de leur extraction. Je n'ai certes pas l'intention de discuter présentement toute la question des corps étrangers de l'œsophage, ce qui m'entraînerait trop loin. Je veux me limiter aux considérations qu'évoque l'observation suivante.

P...a dix-neuf ans, et porte un dentier partiel à la partie médiane du maxillaire inférieur. Cette pièce de prothèse a 3½ centimètres de longueur et supporte deux dents (incisives médianes) Elle a la forme d'un croissant. Durant son sommeil, sans doute un peu agité, le dentier a disparu dans son œsophage. Il vient con-