

SOCIÉTÉ MÉDICALE DE ST-JEAN (IBERVILLE)

Séance du 12 janvier

Présidence de M. MOREAU, (de St Jean.)

En novembre dernier, les médecins des comtés de Chambly, Iberville, Laprairie, Napierville et St-Jean se sont réunis et ont fondé une société médicale dont les membres du bureau ont été élus comme suit :

Président: Dr H. Moreau, St-Jean.

Vice-président: Dr H. Phenix, Henryville.

Sec.Trésorier: Dr J. L. Duval, St-Jean.

Comité de discipline MM. Tassé, Sarrazin et Montgomery.

Les membres tombèrent immédiatement d'accord sur un tarif uniforme, qui a été mis en vigueur, depuis.

A la réunion du 12 janvier 1906, des communications y furent lues par les docteurs Tassé, de St-Jean, et Goudreau, de Lacolle; le premier sur: *le traitement des hémorragies dans les trois premiers mois de la grossesse*; le second sur *l'influence de l'âme sur le corps*.

— M. le Dr Laurendeau sera le prochain conférencier à la séance de février.

J. L. DUVAL,

Sec-Trés., St-Jean.

Péritonite et Salpingite.—Le rapport suivant est tiré d'observations personnelles recueillies à l'Hôpital pour les femmes du Maryland, à Baltimore, pendant que j'en étais le Surintendant aux cours des années 1901 et 1902. On y verra que la Glyco Thymoline a joué un grand rôle dans la pratique de la gynécologie conservatrice, pour laquelle cette institution s'est acquis une réputation dans tous les Etats du Sud.

Madame D. fut admise à l'hôpital le 2 Nov. 1901.—Cinq jours avant la malade avait tenté de s'avorter en se passant une sonde dans l'utérus. A son arrivée la malade n'était pas encore délivrée de son fœtus, et faisait des frissons et 104° de température. On pratiqua un évidement et un curetage utérin. Mais les frissons et la température réapparurent le lendemain avec vomissements et tous les symptômes de la pelvi-péritonite. Le cul-de-sac rempli de pus bombait vers le vagin.

Traitement: Ouverture du cul-de-sac qui permet l'écoulement d'une grande quantité de pus. Les deux trompes de Fallope également remplies de pus sont aussi incisées et leur contenu évacué. Dans chaque incision on place une mèche de gaze à 50 ° de Glyco Thymoline et toute la cavité pelvienne est rembourrée de la même gaze. Ce premier pansement fut renouvelé après cinq jours, puis définitivement enlevé après la 8e journée.—A partir du second jour la patiente était revenue à la normale et la gaze du pansement était stérile si ce n'est la présence de coli-bacilles.

ALBERT F. CONREY, M.D. Balto., Ind.