

gr. à 150 gr.). Il en faut davantage. Seulement la saignée ne convient pas à tous les sujets. On la réservera aux sujets vigoureux, jeunes, à pouls plein, fort, à circulation pulmonaire embâtrassée. Par contre, elle sera contre-indiquée chez tous les malades affaiblis ou débiles. Le *point de côté*, s'il est intense, sera soulagé par une injection sous-cutanée de un demi centigramme de morphine. Le malade, en plus, boira du lait : 1 litre et demi environ, et des tisanes à volonté.

Le second jour, on fera la dérivation intestinale. M. A. Robin prescrit le *calomel*:

Calomel.....	} 44.0 gr. 40
Sucre de lait.....	

Divisez en 4 paquets. Prendre les paquets à 1 heure d'intervalle.

Cette médication produit 2 à 3 garde-robes, accompagnée d'une légère diurèse. Une diurèse plus abondante est obtenue avec des doses plus faibles de calomel (5 centigr. par paquets au lieu de 10 centigr.).

Le troisième jour, en vue d'exercer une action tonique et d'activer la leucocytose et les échanges respiratoires, on prescrira :

Bichlorhydrate de quinine.....	0 gr. 30
P. 1 cachet n° 2.—Un matin et soir.	

Le quatrième jour, si la toux est quintenue, déclitante, les crachats d'une viscosité trop collante, on use de la potion :

Kermès.....	0 gr. 25
ou Oxyde blanc d'antimoine.	0 75 à 1 gr. 50
Alcoolature de racine d'aconit.	X gouttes