

## FORMULAIRE

### Contre la dysménorrhée :

Extrait fluide d'hydrastis canadensis . . . . .	}	à 1 à 2 grammes.
Extrait fluide de viburnum prunifolium . . . . .		
Extrait de piscidia erythrina . . . . .		
Elixir de garus . . . . .		30 grammes.
Sirop simple . . . . .		30 grammes.
Eau distillée de tilleul . . . . .		140 grammes.

Une cuillerée à soupe toutes les deux heures.

### Traitement de la syncope par l'excitation nasale :

Alcool . . . . .	}	à 5 grammes.
Ether . . . . .		
Chloroforme . . . . .		
Menthol . . . . .		1 gramme.
Ammoniaque . . . . .		20 gouttes.

Ou encore :

Alcool . . . . .	10 grammes.
Ether . . . . .	5 grammes.
Menthol . . . . .	1 gramme.
Acide acétique cristallisé . . . . .	40 gouttes.
Pyridine . . . . .	2 grammes.

Versez 15 à 20 gouttes de l'une ou de l'autre de ces solutions sur un mouchoir et les faire respirer au malade.

### Contre l'ulcère de l'estomac :

Bicarbonate de soude . . . . .	}	à 40 grammes.
Sulfate de soude . . . . .		
Chlorure de sodium . . . . .		

Une cuillerée à café ou à soupe à prendre tous les matins à jeun, en 15 ou 30 minutes, par petites gorgées, dissout dans une chopine d'eau chaude, à 35°, 40°, etc. Continuer pendant un mois environ. Alimentation liquide (soupe et lait) par petites gorgées; on peut y ajouter un peu de café ou de thé. Cesser au bout d'un mois.

En cas de constipation, prendre une à deux cuillerées à café de

Poudre de rhubarbe . . . . .	40 grammes	
Carbonate de magnésie . . . . .	}	à 20 grammes.
Sucre . . . . .		
Essence de menthe . . . . .		Q. s.

Si le traitement ci-dessus est mal supporté, 1 à 4 cuillerées à soupe le matin à jeun, de

Nitrate d'argent . . . . .	15 centigr.
Eau distillée . . . . .	100 grammes.

Ne manger qu'une heure et demie après.

(Liebermeister).

### Contre les hémoptysies :

Chlorure de calcium . . . . .	4 grammes.
Sirop d'opium . . . . .	30 grammes.
Eau distillée de tilleul . . . . .	120 grammes.

Une cuillerée à soupe toutes les heures.

(Robir).

### Contre les hémorrhoides :

Teinture d'hamamélis (écorcees) . . . . .	3 grammes.
Vaseline . . . . .	39 grammes.

En application suivant les besoins.

### Contre l'hémoptysie chez le tuberculeux (période cavitaire) :

Poudre d'ipéca . . . . .	3 grammes.	
Sirop d'ipéca . . . . .	}	à 30 grammes.
Sirop diaode . . . . .		

Une cuillerée à café ou à dessert toutes les trois heures jusqu'à obtention de l'état nauséux. Cesser si les vomissements ont tendance à apparaître. Continuer pendant un ou deux jours dans le cas contraire.

Si l'on redoute une aggravation et que la fièvre monte, on remplacera l'ipéca par le tarte stibié.

Tarte stibié . . . . .	0 gr. 03 centig.
Julep gommeux . . . . .	100 grammes

Par cuillerée à café toutes les trois heures, pendant trois jours. (Trousseau)