

d'abuser étrangement des préparations bromurées. Aussi bien les cas d'intoxications lente, c'est-à-dire de *bromisme*, sont-ils aujourd'hui très-fréquents. Bon nombre de sujets, par exemple, offrent de la débilité générale, de la faiblesse du poulx, du refroidissement des extrémités ; une tendance à la stupeur, de la difficulté de parole, l'haleine fétide, de l'acné. D'autres ont un bromisme plus grave et paraissent atteints de démence, de manie ou de paralysie générale. On en a vu enfin qui trouvaient la mort dans un affaiblissement progressif. Le docteur Seguin constate une grande analogie entre le bromisme grave et la paralysie générale. Dans les deux cas, en effet, on observe un tremblement des muscles de la face et de la langue qui trouble d'une manière spéciale la parole ; la maladresse des mouvements ; la diminution de l'intelligence et de la mémoire.

Rarement le bromisme détermine l'exaltation des facultés intellectuelles.

On conçoit que, dans le cas où les symptômes du bromisme viennent s'ajouter à ceux de la maladie contre laquelle le brome est administré, il puisse y avoir des erreurs de diagnostic. On a cru, par exemple, que des épileptiques devenaient aliénés (Voisin) ; que des maladies légères se compliquaient de lésions cérébrales, etc.

Il est donc nécessaire d'apporter beaucoup de prudence dans l'administration des bromures et de ne pas trop croire à leur innocuité. A la longue, en effet, ils amènent l'atonie du système nerveux et troublent sa nutrition.

Voici comment l'auteur procède dans l'administration de ces médicaments :

Dans l'*épilepsie idiopathique*, la seule maladie dans laquelle le médecin soit autorisé à produire un certain degré de bromisme, il prescrit deux solutions :

A) Bromure de potassium.....	$\bar{\text{z}}\text{i}$
— d'ammonium.....	$\bar{\text{z}}\text{ss}$
Eau de fontaine.....	$\bar{\text{z}}\text{vii}$

A prendre à cuillère à café.

B) Bromure de sodium.....	$\bar{\text{z}}\text{i}$
— d'ammonium.....	$\bar{\text{z}}\text{ss}$
Eau de fontaine.....	$\bar{\text{z}}\text{vii}$

Il faut varier les doses de ces médicaments suivant la tolérance, et de manière à obtenir toujours un léger bromisme ; mais il a soin de les faire prendre sans interruption. S'il diminue parfois les doses, jamais il ne supprime le médicament,