

tement sous-cutané ou intra-musculaire de phosphate de créosote. Ces injections ont été poursuivies 112 jours avec un seul arrêt d'une semaine. Commencé à la dose de 1 gr. le phosphate de créosote fut injecté après la première semaine à la dose quotidienne de 3 gr. Les signes morbides disparurent. Au bout de 6 semaines de traitement, absence de bacilles dans les crachats. L'état général s'améliora très rapidement. Augmentation de poids 7 K. 300. Au 1er janvier 1901, mon malade se considère comme guéri et demande à reprendre son métier de voyageur de commerce. Sauf un peu d'obscurité de la respiration au sommet gauche, je ne constate plus aucun signe morbide à la respiration.

OBSERVATION.—Emile O..... peintre âgé de 29 ans, père mort de phthisie, frère atteint de tuberculose. A gagné lui-même cette affection en cohabitant avec ce dernier. Est malade depuis 15 mois. Sommet gauche à petite cavernes plus lésé que le sommet droit où on n'entend que quelques rares craquements. Bacilles dans les crachats qui sont très abondants. Le malade a maigri surtout pendant les 6 derniers mois de 5 kilogr.

Je soumetts au repos absolu le malade qui reçoit chaque jour 3 centimètres cubes de phosphate de créosote. Dès les premiers 8 jours, l'appétit augmente et les crachats s'éclaircissent, sont moins purulents; ceux-ci diminuent après la 16ème injection et sont réduits de moitié. Bacilles moins nombreux. Le poids du corps augmente de 4 à 500 gr. par semaine. Le 38ème jour, nous observons un peu de diarrhée et nous arrêtons les piqûres qui sont reprises après une semaine de nouveau à la dose de 3 gr. par jour. Après 3 mois et demie de traitement, le malade a recouvré son poids normal, c'est-à-dire qu'il a gagné plus de 5 Kilogr. De même, les symptômes objectifs se sont améliorés. On n'entend plus rien au sommet droit et quelques râles seulement et de l'obscurité respiratoire au sommet gauche. Plus de bacilles dans les crachats.

OBSERVATION.—François L..... 39 ans, comptable. Atteint de tuberculose pulmonaire à marche lente depuis 19 mois. Lésions caractéristiques aux deux sommets. Etat général médiocre; fièvre, sueurs nocturnes, expectoration muco-purulente contenant des bacilles.

Nous lui faisons des injections quotidiennes de 3 gr. de phosphate de créosote. La fièvre et les sueurs nocturnes disparaissent après la 6ème injection. Puis l'état général s'améliore et les crachats deviennent muqueux et moins abondants. L'appétit revient et le poids du corps augmente. Le malade après 25 injections de phosphate de créosote se considère comme