

tiente quittait l'hôpital et il ne lui restait plus qu'un certain épaississement des paupières.

Tout médecin est sans doute familier avec l'apparence "pin-cée" et généralement "desséchée" d'une personne qui a souffert quelques jours d'une attaque de choléra. Cette condition est due à l'absorption par les intestins de la lymphe des tissus du corps. Si nous examinons au microscope le sang dans de telles circonstances nous le trouvons riche en constituants solides et pauvre en sérum. C'est justement afin d'obtenir un tel état que le traitement de Hay fut suggéré; parce que, quand le sang est dépourvu de ses constituants liquides, la tension naturelle des vaisseaux est enrayée. Afin de compenser cet état de choses, la sérosité répandue dans les tissus rentre dans la circulation et est ensuite éliminée par la voie intestinale.

Le même effet physiologique a eu lieu dans les deux autres cas, excepté qu'au lieu d'une effusion pleurétique on eut affaire à une effusion qui pénétrait tous les tissus du corps. Quoique le traitement m'ait très bien réussi dans le premier cas, néanmoins je suis convaincu que je me suis un peu hasardé en me fiant entièrement à l'efficacité thérapeutique de la médication. Nous connaissons tous la gravité de la dyspnée qui peut arriver dans des cas semblables quand la poitrine est très distendue par le liquide. A l'avenir dans ces cas je diminuerai la pression des viscères voisins en ôtant un peu de l'effusion par la thoracentèse avant d'avoir recours à cette médication. Les effusions, généralement, ne dépassent pas la troisième côte. Cette médication est donc le plus souvent suffisante. De plus, la raison pour laquelle je n'ai pas eu recours à une thoracentèse partielle, est fondée sur le caractère régulier et non accéléré de la respiration.

Le but de ce traitement est d'introduire dans l'intestin une solution concentrée du sel qui amène un manque de liquide dans l'économie: car nous savons que l'action du sulphate de magnésie est d'exciter une sécrétion copieuse des glandes intestinales. Quelques individus ont une grande intolérance pour ce sel amer et par conséquent le vomissement aussitôt qu'ils l'ont pris. Avec de telles personnes, il est bon d'essayer de l'aromatiser avec de l'essence de menthe, ou de canelle, ou du jus de citron sucré. Le carminatif ne doit pas diminuer la concentration de la drogue. Ceci me porte à dire quelques