

chambre. Quand on a soin de se vêtir chaudement de façon à se garantir contre le refroidissement, on peut sortir, car les mouvements au grand air favorisent les sécrétions naturelles et rendent la méthode dessiccante encore plus efficace. Il faut, en effet, savoir que celle-ci ne trouble en rien les sécrétions naturelles mais qu'en revanche, en diminuant la masse du sang, elle arrête la sécrétion des membranes irritées, parce que les parties disponibles du sang étant prises par les sécrétions normales, les membranes irritées se trouvent privées de matériaux nécessaires à leurs sécrétions morbides."

J. A. LESAGE.

### THERAPEUTIQUE.

Traitement du rhumatisme articulaire aigu, par prof. COMBEMALE, dans *Echo Médical du Nord*, déc. 1902.

#### I. CHEZ L'ADULTE.

Le traitement est à la fois médicamenteux, spécifique et local, et diététique.

1° *T. médicamenteux*: Le salicylate de soude ou l'aspirine sont donnés aussitôt que le diagnostic sera porté.

Le salicylate de soude se donne à la dose journalière de 6 grammes (90 grains) ou l'aspirine à la dose de 4 grammes durant quatre ou dix jours au plus. Il faut ne diminuer la dose que quatre jours après que la douleur et la fièvre seront calmées. Donnez l'un ou l'autre de ces médicaments durant deux semaines en en diminuant la dose graduellement, soit :

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| 1re semaine— | Salicylate de soude.....    | 6 grammes par jour. |
| do           | —Aspirine.....              | 4 " "               |
| 2me do       | —Salicylate de soude.....   | 4 " "               |
| do           | —Aspirine.....              | 3 " "               |
| 3me do       | —Salicylate }<br>Aspirine } | 2 " "               |

" Ne supprimez complètement l'un ou l'autre de ces deux médicaments que lorsque le rhumatisme aura passé une semaine sans retour offensif des douleurs."

*Le séjour au lit* est indispensable, car le salicylate ne s'accommode pas de la station debout.

On peut formuler de la façon suivante :

Aspirine ..... 6 grammes (90 grains).

En 6 cachets ; un toutes les trois heures.

On peut aussi donner des poudres ou cachets de sal. de soude, mais on donne avec succès l'une des potions suivantes :

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| I. Salicylate de soude..... | 6 grammes (90 grains). |
| Sirop de framboises.....    | 20 " (I c. a. s.)      |
| Eau .....                   | 70 " "                 |

Une cuillerée à café (1 gramme de sal) toutes les 4 heures dans un verre d'eau de Vichy.

Ou bien :

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| II. Salicylate de soude.....           | 6 grammes |
| Sirop d'écorces d'oranges amères ..... | 50 "      |
| Rhum vieux.....                        | 20 "      |
| Eau.....                               | 50 "      |