

## APPLICATIONS A L'ENDOMÉTRITE CERVICALE.

Après que le cervix est dilaté, on doit le nettoyer à l'aide d'une sonde garnie de coton boraté et enlever le mucus adhérent au col et au canal cervical, ce mucus est très difficile à détacher étant d'une consistance très visqueuse on se sert quelquefois d'un jet d'eau chaude dirigé sur le col pour enlever le mucus ce qui nettoie plus facilement et permet en même temps d'examiner plus facilement l'état du col et la muqueuse cervicale.

## CAUTÉRISATION DU COL ET DE L'ENDOMÉTRIUM.

Thomas Winkel conseille la cautérisation du cervix mais dans le cas où il existe des végétations, il vaut mieux se servir de la curette aigüe avant de cautériser la muqueuse cervicale.

Lomor Alkill préconise la cautérisation par le nitrate d'argent.

Playfair conseille l'acide carbolique.

De Sinety conseille l'acide chromique.

N. B.—Il est bien de dire à ce sujet que quelquefois les applications d'acide chromique ont été suivies d'empoisonnement du sang mais les preuves de cet empoisonnement ne sont pas certaines car nous n'avons aucune statistique à ce sujet.

Thomas, Lawson Tait, et Talliofero, Shchoder de Testh sont tous en faveur de la cautérisation du cervix dans l'endométrite cervicale.

Paul F. Munde est opposé aux injections intra-utérines cautérisantes.

E. Rlond de St Rolon préconise le sulfate de cuivre.

Le professeur James P. White de Buffalo préconise l'iode. Dans ma pratique, j'aime mieux me servir de la teinture d'iode de Churchill.

Wilkens se sert de l'acide carbolique.

Cragen (*Essentials of Gynæcology*), 1890, enseigne que l'on doit cautériser l'endométriium cervical et commencer par la dilatation préalable et si la cautérisation n'amène pas la guérison, employer la curette il vante aussi les bons effets de l'iodo-phénol comme cautérisant.

Thomas dans son ouvrage sur les maladies des femmes, dit en parlant de la cautérisation de l'endométriium que les effets des escharotiques sur les membranes muqueuses utérine et cervicale sont de modifier profondément l'action morbide existante et de diminuer son intensité et d'en arrêter les progrès, et il emploie le nitrate d'argent (méthode de Lente) ou bien la teinture d'iode.

Comme on a pu le voir on emploie dans le traitement de l'endométrite cervicale un grand nombre d'agents cautérisateurs.

L'acide chromique, phénique, l'iodo-phénol, l'iode simple ou celle