

decin peut efficacement agir, et le seul moyen dont il dispose pour les stimuler est l'électricité.

Mais si l'électricité donne de bons, ou mieux, d'excellents résultats, c'est à deux conditions seulement ; électriser les malades avec persévérance, employer la modalité électrique convenable.

Il n'est point rare, en effet, de voir des médecins électrisant sans conviction leurs petits malades se décourager et abandonner le traitement au bout de quelques semaines. Or, il ne faut pas oublier que le traitement de la paralysie infantile demande toujours plusieurs mois et même, dans les cas graves, une année et plus.

C'est au courant galvanique que le médecin devra d'abord avoir recours. Pendant les premières semaines, il fera la galvanisation de la moelle en se servant de larges électrodes et en employant les courants descendants. L'intensité du courant devra toujours être faible et ne pas dépasser 10 à 12 m A. La durée de chaque séance variera entre cinq et dix minutes au maximum. Comme nous l'avons déjà dit, les conditions sont d'autant meilleures que le début de l'affection est plus récent. On devra donc employer les courants galvaniques dès la fin de la première semaine, lorsque les accidents fébriles auront cessé, et faire une séance tous les deux jours.

On galvanisera ensuite les muscles paralysés. Pour ce faire, on appliquera sur la colonne vertébrale une large plaque de la grandeur de la main environ. Cette électrode (plaque d'étain recouverte de peau de chamois) sera placée au niveau de la région cervicale ou de la région lombaire, suivant que la paralysie aura atteint le membre supérieur ou le membre inférieur. L'autre électrode sera promenée sur les muscles malades. On pourra encore, et plus commodément, faire mettre la main ou le pied de l'enfant dans une cuvette remplie d'eau tiède, et dans laquelle plongera l'électrode négative.

Chaque séance aura une durée de dix minutes, l'intensité du courant étant de 10 m. A., et sera terminée par une série d'interruptions. Ces interruptions seront peu fréquentes au début, et plus nombreuses lorsque la maladie sera plus ancienne. Les séances auront lieu quatre ou cinq fois par semaine pendant trois mois. On laissera alors l'enfant au repos pendant un mois pour reprendre de nouveau le traitement.

Il nous reste à porter des courants faradiques que beaucoup de médecins emploient presque exclusivement dans toutes les paralysies.