

CARNASSIERS-CHÉIROPTÈRES, page 43 du présent volume, à la suite de *Vespertilio pruinosus*, ajoutez : *Vespertilio nocturne*, V. *noctivagans*, Lec., qui a été pris à Montréal.

CARNASSIERS-INSECTIVORES, page 44, à la suite de *Sorex parvus*, ajoutez : Musaraigne de Thompson, *Sorex Thomp-soni*, Baird ; M. de Dekay, *S. Dekayi*, Bachman ; et M. de Cooper. *S. Cooperi*, Bachman ; les deux premières ont été trouvées à Montréal et la troisième à St. Césaire.

RONGEURS, famille des Rats, page 47, à la suite de *Arvicola borealis*, ajoutez : Campagnol de Drummond, *Arv. Drummondii*, Aud. et Bachman, qui a été trouvé à Montréal,

RONGEURS, famille des Porcs-épics, à la suite de *Erethizo dorsatus*, ajoutez : Eréthizon épixanthe, *Er. epixanthus*, Brandt, qui a été pris dernièrement au canton Langevin.

Voici maintenant une description sommaire de ces différentes espèces.

**Vespertilion nocturne**, *Vespertilio noctivagans*, Leconte. V. *Auduboni*, Harl.—Angl. *Silver-haired Bat*.—Longueur  $3\frac{1}{2}$  pouces ; queue  $1\frac{1}{4}$  ; étendue des ailes 10 pouces. Noire avec le bout des poils argentés, et portant un collier blanchard en travers des épaules s'étendant au dessus des oreilles.

Un peu plus grand que le Vespertilion subulé et s'en distinguant surtout par sa bande grise des épaules.

**La Musaraigne de Thompson**, *Sorex Thomp-soni*, Baird.—Longueur 2 pouces ; queue  $1\frac{1}{4}$ . D'un brun olive en dessus, plus clair sur les côtés, mais sans teinte de roux ; d'un blanc cendré en dessous. Queue terminée par un pinceau de poils. Dents 30 ; l'incisive supérieure antérieure avec une dent interne vers sa pointe.—Montréal.

**La Musaraigne de Dekay**, *Sorex Dekayi*, Bachman.—Longueur 5 à 6 pouces, sans oreilles extérieures. D'un brun bleuâtre uniforme. Queue presque carrée avec quelques