

semblable exploration qu'à la condition d'utiliser des gants de caoutchouc qui sont quittés et changés pour l'opération.

Wertheim conseille la laparatomie exploratrice. Il l'a pratiquée 73 fois sur 500 malades. Pour lui, elle seule permet de se rendre compte exactement de l'état des ganglions, des uretères et de la vessie. Il convient de commencer l'exploration par l'examen des ganglions dont l'état peut fournir une contre-indication immédiate.

CHIFFRE D'OPÉRABILITÉ

M. Pollosson a quatre séries d'observations s'étendant de 1904 à 1908.

Dans la 1 ^{ère} série,	l'opération	était de	54. %
Dans la 2 ^{ème}	"	"	88. %
Dans la 3 ^{ème}	"	"	76. %
Dans la 4 ^{ème}	"	"	77. %

Dans les hystérectomies vaginales pour cancer du col, l'opérabilité était de 12 à 14%.

L'opérabilité du cancer du col utérin était, à la clinique de Vienne, avant que l'on intervint par la méthode de Wertheim, d'environ 15%. Depuis l'emploi de sa méthode, l'opération atteint 30, puis 50, puis 61.9%.

MORTALITÉ OPÉRATOIRE

Depuis plus de 11 ans que Wertheim pratique son opération, il a pu réunir 500 observations.

Pour le premier cent, la mortalité a été de 30

" " 2^{ème} " " " " 22