comprend des individus plus vieux que le groupe provenant du détroit de Northumberland. Il faudra étudier cela plus attentivement et se rendre compte si cette différence est due au procédé de pêche ou à quelque particularité due à la vie de ces harengs.

Mes spécimens provenant de la partie sud du golfe ne comprennent pas de jeunes individus non adultes. Sous ce rapport, il est intéressant de noter que M. J. J. Cowie, d'après ses expériences de pêche, a attiré l'attention sur la présence, dans le golfe, de bancs de jeunes harengs qu'il compare aux « matjes » écossais. D'après les recherches faites sur la croissance de ces harengs du golfe, on devrait conclure d'avance que le petit et le jeune hareng de ce type doit être très semblable au jeune hareng de la mer du Nord, et les indications données par M. Cowie seront fort utiles aux recherches futures.

TABLEAU N° 11.—Spécimens de harengs de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, automne 1914.

Groupes d'échantillons	Nombre d'individus dans chaque groupe.	Pourcentage d'âge des différents échantillons.										
		3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
A.....	60	5	90	5								
E.....	135			3	5.9	16.3	11.1	31.1	17.9	11.9	1.5	1.5

A. Jeune hareng non adulte du havre de Halifax.
E. Banc de frai de Lockport.

Dans le tableau 11 je donne le résultat de deux échantillons (dont il a été question aux tableaux 2 et 3). Le groupe d'échantillons A, du havre de Halifax, ne contenait que de jeunes harengs. L'échantillon «E» ne contenait que des harengs adultes de la côte de la Nouvelle-Écosse sur l'Atlantique. Je me bornerai à donner les chiffres du tableau qui tirent leur principale importance de la comparaison qu'ils permettront de faire avec les échantillons qu'on amassera pour les recherches ultérieures.