

potion. Au-delà de cette dose il devient toxique, et cette toxicité se traduit surtout par l'ébriété.

Les principes chimiques du cannabis, tel que le tannate de cannabine et le cannabinol n'ont pas donné d'effets précis ni favorables, sans doute parce que ce ne sont pas les véritables principes.

Le cannabis est le véritable sédatif de l'estomac, sans aucun des inconvénients des narcotiques comme l'opium et le chloral, des absorbants comme le bismuth, des sédatifs généraux comme le bromure de potassium, des paralgésiants comme l'antipyrine, qui ont tous des effets défavorables sur le tube digestif. L'action du cannabis réclame nécessairement le concours des autres méthodes curatives qui remplissent comme les alcalins à hautes doses, comme certains purgatifs, et plus rarement les antiseptiques, des indications précises; elle exige surtout les règles du régime telles qu'elles ressortent des recherches récentes de la physiologie sur la connexité remarquable de l'estomac et de l'intestin.—*Lyon médical.*

**Traitement de l'épilepsie par le biborate de soude.**—RUSSELL et J. TAYLOR ont employé dans le traitement de l'épilepsie le biborate de soude, qui a été proposé par Fulsom et par Gowers. Ils l'ont d'abord administré à la dose de 2 grammes par 24 heures, en le portant le plus rapidement possible à la dose de 12 grammes; mais des troubles gastro-intestinaux se produisent rapidement lorsqu'on emploie des doses aussi fortes, on est obligé de suspendre le traitement et on ne gagne rien pour la rapidité. Aussi ces observateurs sont arrivés à ne plus prescrire que 6 grammes à prendre en trois fois après les repas.

Ce médicament diminue incontestablement le nombre des attaques; il agit dans bien des cas où le bromure a échoué, et on peut l'administrer dans des cas où l'emploi du bromure à doses suffisantes détermine une grande dépression.

Cependant, le borax a quelques inconvénients: le plus fréquent est l'apparition sur les lèvres de petites vésicules qui se transforment en croûtes fendillées analogues aux gercures. Dans quelques cas on voit se produire sur les extrémités des membres, et plus rarement sur le tronc, des éruptions eczématiformes ou p-oriasi-formes.

Les troubles digestifs (vomissements, diarrhée) sont plus rares que les éruptions.

Beaucoup de malades maigrissent et dépérissent lorsque le traitement est continué pendant un certain temps, mais dans aucun cas, Russell et Taylor n'ont vu apparaître de traces de dépression intellectuelle.

Lorsqu'il survient quelque inconvénient de ce genre, il suffit d'interrompre la médication.—*Bulletin médical.*