

précédentes : soutenir l'organisme par une alimentation aussi réparatrice que possible et les toniques les plus puissants.

Éviter avec soin, dans sa thérapeutique, même au début, tout ce qui est susceptible de déprimer le malade, déjà suffisamment abattu et anémié par la maladie.

Les fonctions digestives devront être particulièrement surveillées.

Quant au traitement, le voici : en suivant l'ordre de ces trois principales indications.

1o Dès le début, donner aux petits malades, trois fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, de deux à cinq gouttes (chaque fois et suivant l'âge), du mélange suivant :

Teinture de belladone.....	} ââ 5 grammes.
Teinture de valériane.....	
Alcoolature de racine d'aconit.....	

Puis matin et soir, une pulvérisation de trois à quatre minutes avec :

Bromure de camphre.....	5	à	10 grammes.
Hydrate de chloral.....	0.50	à	2 —
Eau distillée filtrée.....		à	150 —

Cette solution doit être employée glacée.

Le reste de la journée, et dans l'intervalle des repas, le petit malade suce des fragments de glace saupoudrés d'acide borique, et s'il peut, se gargarise avec une solution boriquée à 40/1000.

2o Toutes les deux heures au début, on doit pratiquer sur toute la muqueuse pharyngo-laryngée, à l'aide d'un pinceau de martre ou de blaireau, des attouchements avec la solution suivante :

Chlorure de zinc.....	1 gramme
Glycérine neutre.....	15 —
Eau distillée.....	15 —
Acide chlorhydrique.....	2 gouttes

Ces badigeonnages sont admirablement supportés par les muqueuses et aussi par les malades, qui n'accusent aucune douleur.

Le travail de M. Ragoneau ne s'appuie que sur cinq cas heureux, tous d'ailleurs consécutifs à des symptômes d'embarras gastrique.

### Pharyngite tuberculeuse.—*Solis Cohen.*

P.—Créosote de hêtre.....	5 minimes.
Teinture d'iode.....	5 “
Iodure de potassium.....	20 grains.
Glycérine.....	1 once.

M—Usage local, plusieurs fois par jour.—*College and Clinical Record.*