

TRAVAUX ORIGINAUX

EXPOSÉ SUCCINCT DES RÉSULTATS OBTENUS ET DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE DANS DEUX CENT QUARANTE-HUIT OPÉRATIONS ABDOMINALES.

Par le Dr A. Laphorn SMITH, B. A. M. D., M. R. C. S., England, professeur de clinique de gynécologie à l'Université Bishop, chirurgien à l'hôpital Western et Samaritain.

La question qui de nos jours intéresse au plus haut point tout gynécologiste est celle-ci : Quels moyens prendre pour réduire au minimum le taux de la mortalité dans les opérations abdominales ? Le praticien consciencieux, de son côté, s'enquiert soigneusement des bons et mauvais résultats obtenus en pareilles circonstances et ce n'est qu'après avoir pesé le pour et le contre qu'il recommande à sa patiente de subir telle ou telle opération abdominale.

La malade d'ordinaire, de beaucoup la plus intéressée dans l'heureuse issue de l'opération, se laisse guider par son médecin.

Pour moi, personnellement, je cherche avant tout à réduire le pour cent de la mortalité dans mes opérations, sans pour cela négliger les questions d'importance majeure, tels que les résultats ultimes de la section abdominale, car, il faut bien l'avouer, plusieurs personnes, après avoir au risque de leur vie subi de sérieuses opérations, n'en ont bénéficié d'aucune manière.

Cependant, il est très consolant de voir, d'année en année, diminuer le pour cent de la mortalité et augmenter celui des résultats satisfaisants. Aussi, est-il facile de comprendre cette rivalité active et amicale qui augmente de jour en jour entre les principaux opérateurs du monde entier, rivalité ayant pour but non seulement de réduire le plus possible le taux de la mortalité, mais aussi de retirer, des grands moyens à notre disposition, tout le bien-être que l'on puisse en attendre dans l'intérêt de nos malades. Les statistiques pour présenter quelque intérêt doivent être très exactes. Je vais offrir à mes lecteurs la mienne, telle que faite depuis le 20 novembre 1895, date à laquelle j'écrivais mon dernier rapport constatant 11 décès sur 143 laparatomies. Depuis, j'ai fait 105 opérations abdominales, au cours desquelles 6 de mes malades ont succombé. Ainsi donc j'ai fait en tout 248 sections abdominales, et j'ai perdu 17 malades, ou un pourcentage de $6\frac{1}{2}$, et cela dans l'espace de 8 ans.