

MEMOIRES

LA COXA VARA

Dr M. AHERN, chirurgien de l'Hôtel-Dieu

Parmi les affections de la hanche qui amènent la claudication il en est une qui est rarement diagnostiquée, c'est la coxa vara.

Une observation récente me fournit l'occasion d'en parler.

La coxa vara est un ramollissement, non inflammatoire, du col fémoral, accompagné ou suivi d'abaissement de ce dernier et de raccourcissement du membre inférieur avec gêne de certains mouvements de la hanche.

A l'état normal l'axe du col forme avec l'axe du corps du fémur un angle ouvert en bas et en dedans, angle d'*inclinaison*, qui varie légèrement de 125 à 130 degrés, suivant les âges et les sujets. Cet angle est supérieur de 4 à 5 degrés chez l'enfant à ce qu'il sera plus tard chez l'adulte. Chez le vieillard il est encore moindre. Pour certaines raisons, peu connues, cet angle peut augmenter ou ce qui est plus fréquent diminuer. Hofmeister en 1894 donna à cette dernière variation le nom de "Coxa Vara"; en 1895 Mauclaire donna à la première celui de "Coxa Valga."

Les symptômes de la coxa vara ont presque toujours été attribués à la coxalgie. C'est même par l'étude de pièces enlevées, par Ernest Müller, pendant une résection à la hanche pour coxalgie qu'il a pu constater que cette dernière n'existait pas et que les symptômes observés étaient uniquement dus à un abaissement du col du fémur. C'est en 1889 que Müller attira l'attention de cette difformité et l'érigea en entité morbide.