

Ще прикритими бувають комікації
ткани в епідермі м'якого прища так, що цілі
хоробі називаємо *ulcus molle gangraeno-*
sum; і 2) коли м'який прищ показує накин-
ше раз дуже розширити ся і займати су-
вітну пірну, нігас коли нерви хопі місця го-
ить ся і покривають ся прамами. Сеп пір м'я-
кого прища називає ся *ulcus molle serpigini-*
nosum (м'який прищ повзючий); він може
тривати навіть кілька до і кіляканіяти мі-

4. Запалене головки мужського члена

(*balanitis*).

Головка (жодуль) мужського члена по-
крита у новонародженої дитини загнутою. Але
нігас пологового дєзрівана показує ся припо-
на потреба загнути мужський член, то зн.
виглядати загну з головки в заї так, щоб
голівка обнякла ся. Ліє ся се, через напру-
жене (ерекцію) мужського члена, при чім
голівка неначе висуває ся з під загнути. Ко-
ли загну на нерві звужена так, що не може
виглянути ся, то під нею набодрас ся доволі
лобоватої маси, або пераз занеючиє ся го-
лівка під загнутою триніровим гноєм і від того
всього пухне, червоніє і стає болючою пікра
голівки, а сей стан називаємо запаленем го-
ловки. В горячі часи в діті в горячих землях,
як Arabia, Palestina, вистуває се запалене
частини між у зимі або в зимних краях. То-
му то заведено у народів у горячих місцях,