

tumeur du limbe. De couleur violacée avec des taches noires, elle s'est surtout accrue dans le cours de la dernière année, époque à laquelle elle fut cautérisée en ville tous les deux jours avec du nitrate d'argent. Indolente au début, elle n'a provoqué des douleurs, que quelques jours avant notre examen. Elle mesure un centimètre de long sur 5 à 7 centimètres de large. Son adhérence avec la moitié externe de la cornée semble être intime. De nombreux vaisseaux conjonctivaux dilatés et sinueux s'y rendent. En mai 1883, nous procédons à l'énucléation, et le malade est guéri sept jours après. Cette guérison subsistait en janvier 1885, de sorte qu'elle peut être envisagée comme définitive.

*Examen microscopique :*

Montre la tumeur adhérente à la sclérotique et à la moitié de la cornée. Ces deux membranes sont saines, ainsi que l'iris et le corps ciliaire, preuve qu'il s'agit d'un néoplasme exclusivement épibulbaire.

*Examen microscopique.*—Une mince couche d'épithélium pavimenteux s'étend sans discontinuer de la cornée à la conjonctive en passant par la tumeur. De plus, au niveau de l'angle de réunion de celle-ci avec la cornée un coin épithélial s'interpose dans une certaine étendue. La membrane de Bowman y est respectée, alors que plus loin elle manque, mais sans qu'aucun élément de la tumeur se soit infiltré entre les lames corneuses.

La sclérotique bien que saine est parcourue par de nombreux vaisseaux gorgés de sang, qu'on peut suivre jusqu'à l'équateur. Quelques-uns de ceux épiscléraux sont entourés de noyaux embryoplastiques. Tout le reste de l'œil est normal, sauf certaines cellules étoilées pigmentées qu'on retrouve dans les espaces de Fontana et dans la trame du muscle ciliaire. Elles ne diffèrent en rien de celles de la *lamina fusca*, et n'ont aucun rapport de continuité avec les produits mélaniques de la tumeur.

A un faible grossissement celles-ci, se montrent formées de trois lobes, l'antérieur d'aspect granité, le moyen plus homogène et l'externe ou postérieur contenant des îlots noirs. Bien qu'en apparence dissemblables, ces trois parties ont la même constitution : on y trouve des cylindres épithéliaux séparés par un stroma conjonctif aux vaisseaux et ne diffèrent que par la disposition des deux parties constituantes. C'est ainsi que dans les premiers lobules les cylindres épithéliaux sont séparés les uns des autres, tandis que dans le second ils sont très rapprochés ; dans le troisième les travées connectives sont gorgées de pigment mélanique qui s'infiltré même au sein des éléments épithéliaux.

A un plus fort grossissement la tumeur apparaît constituée par de petites masses dont la forme et le volume varient et qui sont