

Contre l'insuffisance thyroïdienne, on emploiera la thyroïdine de la façon suivante :

•La malade prendra 1 ou 2 pilules de thyroïdine par jour ; le traitement commencera huit jours après la fin des dernières règles et se prolongera jusqu'à la fin de la période menstruelle suivante, puis on le recommencera huit jours après, et ainsi de suite, jusqu'à cessation complète des troubles.

Contre l'insuffisance thyroïdienne et ovarienne associées, on donnera 1 à 4 pilules d'ocréine et 1 ou 2 de thyroïdine pendant vingt jours par mois.

Chez les femmes qui présentent de l'insuffisance thyroïdienne pendant la période intermenstruelle et de l'insuffisance ovarienne pendant la période menstruelle, on donnera 1 ou 2 pilules de thyroïdine tous les jours, pendant vingt jours par mois, en commençant le traitement huit jours après la fin des dernières règles, et 1 à 4 pilules d'ocréine tous les jours, en commençant huit jours avant les règles et en prolongeant le traitement jusqu'à la fin de la période cataméniale.

* * *

LES TROUBLES MENSTRUELS CHEZ LA FEMME. LEUR CAUSE. —
LEUR TRAITEMENT.

Tableau résumé.

Règles rares, règles peu abondantes, règles douloureuses, accès d'oppression, palpitations, bouffées de chaleur, irritabilités nerveuses, insomnie, etc. ; *causes* : insuffisance ovarienne ; *traitement* : ocréine

Règles fréquentes, règles abondantes, règles de trop longue durée, migraines, œdèmes transitoires, constipation, douleur rhumatoïdes, etc. ; *causes* : insuffisance thyroïdienne ; *traitement* : thyroïdine.

Aménorrhée ; *causes* : insuffisance ovarienne et thyroïdienne associées ; *traitement* : thyroïdine et ocréine associées.

(Le Bulletin Médical, 7 juillet 1909.)