

眼肌癱

此爲眼肌漸癱疾病、其類有二、即眼外肌癱、及眼內肌癱、惟內

外二肌之癱

並作者亦有之。

眼外肌癱 眼外肌之癱、其輕重靡有一定、其原即系結漸壞、或爲瘤所壓、或顱底腦衣炎所致、其先受累者、是惟提上瞼肌及上直肌、而後乃及其他、致於其眼不動而上瞼墜、其眼球或稍凸、此其病爲疾病、或纏綿多年、其起也、常有癱瘓、失和動、及漸佈肌枯症等同之、其靈心或亂、或視系及他顱系亦枯、然系無病者亦有之。

眼內肌癱

其肌漸癱、致瞳不動而視遠近之功亦失。

眼肌癱急者少甚、其故即眼肌系之本結流血而軟也。

眼肌癱治法

療之之事、最要當究其原、腦球病如失和動等所致者、

療之實難、癰致之者、服錄及鉍氫鹽常有益、其自療者亦有之、用鑒及士的年亦無不可、其士的年當以之射皮、其病之起急而痛者、最宜熱水猒及外激內效藥、或置水蛭於其太陽、亦足止其痛、電亦有用之者、然不必有益、其視一而見二之病、當如眼科療法療之。